

اطلاعات مربوط به افراد
درمان شده با
DuoResp Spiromax[®]



DuoResp[®]
Spiromax[®]
budesonid / formoterol

چه عواملی باعث بروز نشانه‌های آسم و COPD می‌شود؟

نشانه‌های آسم و COPD (بیماری انسداد مزمن ریه) در اثر التهاب مجاری تنفسی بروز می‌کند. نایژه‌ها، مجاری ورود و خروج هوا به/از شش‌ها هستند. التهاب نایژه‌ها باعث کاهش قطر داخلی آنها و هر از گاهی باعث پر شدن آنها با مخاط می‌شود. در این وضعیت، بیمار به سختی نفس می‌کشد و ممکن است یک یا چند نشانه زیر را احساس کند:

- تنگی نفس
- خس‌خس
- سرفه
- تنگی در قفسه سینه

حای DuoResp Spiromax® دو عامل فعال است:

- بودسونید (Budesonide) احتمال بروز التهاب در مجاری تنفسی را کاهش می‌دهد و از آن جلوگیری می‌کند.
- فورموترول (Formoterol) به باز شدن مجاری تنفسی کمک می‌کند و هم بلافاصله و هم در بلندمدت علائم را از میان می‌برد.

چرا DuoResp Spiromax® برای من تجویز شده است؟

DuoResp Spiromax دارویی است که برای درمان آسم و بیماری انسداد مزمن ریه (COPD) به کار می‌رود. پزشک شما، DuoResp Spiromax را برایتان تجویز کرده است تا بتوانید بیماری خود را مدیریت کنید و از بروز نشانه‌هایی که زندگی روزمره شما را مختل می‌کند، پیشگیری نمایید.

لازم است دارو را حتی پس از احساس بهبودی طبق دستور پزشک خود مصرف نمایید. همچنین، رعایت دستورهای که برای مصرف درست دارو به شما داده می‌شود، الزامی است. اگر افشانه دارید، باید استفاده از آن را طبق دستور ادامه دهید.

روش استفاده از DuoResp Spiromax®

محل نوشتن
تاریخ باز
شدن
یسته بندی
آلومینیومی

نشانگر
میزان
مصرف



پزشک، پرستار یا متصدی داروخانه روش استفاده از DuoResp Spiromax را به شما آموزش می‌دهد. اگر پرسشی داشتید، با آنها در میان بگذارید!

باز کردن درپوش محافظ

افشانه را طوری بگیرید که درپوش محافظ دهنی رو به پایین باشد. دهنی را با پایین کشیدن درپوش باز کنید. شنیده شدن صدای "تق" به معنی باز شدن کامل دهنی است. مقدار دارویی که باید استنشاق کنید، به‌طور خودکار پس از باز شدن درپوش اندازه‌گیری می‌شود.

بیرون دادن نفس

اکنون باید شش‌های خود را خالی کنید. خارج کردن هوای شش‌ها را تا جایی که به زحمت نیفتید، ادامه دهید. به داخل افشانه ندمید!



استنشاق دارو

اکنون دهنی را بین دندان‌های خود قرار دهید و لبهای خود را به آرامی به دور دهنی فشار دهید؛ دهنی افشانه را گاز نگیرید. همچنین، منافذ هوا را با انگشتان خود مسدود نکنید. از طریق دهنی با قدرت نفس عمیق بکشید.

نگه داشتن نفس

افشانه را از دهان خود خارج کنید و نفس خود را به مدت 10 ثانیه یا تا زمانی که فشاری به شما وارد نشود، نگه دارید.



بستن

نفس خود را به آرامی - و نه از طریق افشانه - بیرون بدهید و درپوش محافظ دهنی را ببندید.



توجه داشته باشید:

- افشانه را پیش از مصرف تکان ندهید.
- پس از استفاده از افشانه، دهان خود را آب بکشید.
- پس از مصرف DuoResp Spiromax[®] ممکن است مزه خاصی در دهان خود حس کنید. این وضعیت کاملاً طبیعی است و به دلیل وجود لاکتوز برنده است.
- اگر درپوش محافظ بدون مصرف دارو باز و بسته شود، مقدار صحیح مصرف تا نوبت استفاده بعدی از افشانه در جای خود باقی می‌ماند. با وجود این، اگر نمی‌خواهید از افشانه استفاده کنید، از باز کردن و بستن درپوش بپرهیزید زیرا با هر بار باز و بسته شدن درپوش، نشانگر مقدار مصرف تعداد دفعات مصرف باقی‌مانده را یک واحد کاهش می‌دهد.

برنامه درمانی شما

میزان مصرف **DuoResp Spiromax®** برای شما عبارت است از:

اطلاعات تماس:

پزشک/پرستار:

شماره تلفن:

ساعات تماس:

داروی نسخه‌ای **DuoResp Spiromax®** (بودسونید/فورموترویل) پودر استنشاقی. داروی نسخه‌ای. روش مصرف: DuoResp Spiromax برای درمان آسم یا بیماری انسداد مزمن ریه (COPD) کاربرد دارد. DuoResp Spiromax فقط برای افراد ۱۸ ساله و بالاتر تجویز می‌شود. هشدارها و اقدامات احتیاطی: اگر به بیماری دیگری مبتلا هستید یا داروهای دیگری مصرف می‌کنید، پیش از استفاده از DuoResp Spiromax با پزشک، داروساز یا پرستار خود مشورت کنید. اگر زن باردار یا شیرده هستید، خود را احتمالاً باردار می‌دانید یا قصد باردار شدن دارید، باید پیش از مصرف این دارو با پزشک، داروساز یا پرستار خود مشورت کنید. برگه اطلاعات را به دقت بخوانید. DuoResp Spiromax را شرکت Teva Sweden به نشانی 10 SE-251 1070 Box یا پرستار خود عرضه کرده است. مارس ۲۰۱۷
SW/RESP/17/0013a