

دواء بيكو بريبي®

تعليمات تهيئة الأمعاء قبل تنظير القولون



بيكو بريبي®


دواء بيكو بريبي (بيكوسلفات الصوديوم، أكسيد المغنيسيوم، وحامض الستريك.)

التركيب: بودرة لعمل معلق يتم تناوله عبر الفم.

دواعي الاستخدام: يوصف بيكو بريبي للبالغين، والمراهقين، والأطفال من عمر عام. يوصف لتهيئة الأمعاء قبل الخضوع للفحص بأشعة إكس أو للتنظير. يوصف لتهيئة الأمعاء عندما يمثل ضرورة سريرية قبل الخضوع للجراحة. الكود الكيميائي العلاجي التشريحي ATC: A06AB58.

حجم العبوة: كيسان. مواصفات Rx, F محدثة في 08-08-2016

للحصول على معلومات الدواء وأسعاره، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.fass.se. اتبع تعليمات طبيبك دائمًا. كن ملماً بنشرة المعلومات الموجهة للمريض والمرفقة في العبوة قبل رؤيتك للمنتج.



جدول زمني لتنظير القولون

يتم جدولة تنظير القولون لـ:

التاريخ:

الوقت:

بيكو بريبي® كيس واحد

التاريخ:

الوقت:

بيكو بريبي® كيسان

التاريخ:

الوقت:

فضلاً تواصل مع الطبيب أو الممرض إن كانت لديك أي استفسارات حيال الفحص الذي ستخضع له أو كيفية الإعداد له.

هناك فيديو تعليمي يوضح كيفية خلط وتناول دواء بيكو بريبي على الموقع الإلكتروني medicininstruktioner.se (باللغة السويدية). يمكنك أيضاً قراءة وتنزيل نصائح ووصفات أطعمة سهلة الهضم لتتناولها قبل الخضوع للفحص من خلال الموقع.

تعليمات تهيئة الأمعاء قبل تنظيف القولون

أشار عليك الطبي أو الممرض بالخضوع لتنظيف القولون. تعمل نشرة المعلومات تلك على تقديم أفضل طريقة لتهيئة نفسك للخضوع لذلك الفحص. كن ملماً بنشرة المعلومات الموجهة للمريض والمرفقة في العبوة قبل رؤيتك للمنتج.

ما هو تنظيف القولون؟

أثناء الخضوع لعملية تنظيف القولون، سيقوم الطبيب\الممرض باستخدام أدا فحص مرنة وطويلة(في نفس سمك إصبعك) تسمى بمنظار القولون. حيث سيتم إدخالها في فتحة الشرج مستمرة من خلال المستقيم وصولاً للأمعاء الغليظة. يمكن أن تتناول دواء مهدئ أثناء عملية الفحص. عادة يشعر الشخص الذي يخضع للفحص بالم طفيف أو لا يشعر بأي ألم على الإطلاق أثناء عملية الفحص. يحتوي منظار القولون على ضوء وكاميرا حتى يوفر إمكانية رؤية الأمعاء.

ما السبب وراء القيام بتنظيف القولون؟

يهدف تنظيف القولون إلى فحص الأمعاء واكتشاف أي:

- التهاب (تورم و/ أو احمرار)
- ورم حميد
- مؤشرات للحالات السابقة للسرطان أو سرطانات محتملة
- مسببات أخرى لمشكلات الأمعاء

يوفر الفحص إمكانية للطبيب\الممرض لإزالة الأورام الحميدة قبل حولها لتكون خبيثة كما يمكنهم من أخذ عينات من الغشاء المخاطي (الخزعات) لإجراء تحاليل إضافية.

ما هي الشروط الواجب توافرها لنجاح تنظيف القولون؟

تبدأ عملية تنظيف القولون بأمعاء فارغة ونظيفة. حيث يمكن ذلك الوضع الطبيب\الممرض من رؤية وفحص الأمعاء في ظل ظروف مثالية. في حالة حضورك للخضوع لعملية الفحص وفي أمعائك فضلات، يمكنها التسبب في إعاقة رؤية وتقييم إذا ما كان هناك أورام حميدة أو سرطان في الأمعاء أم لا. ويمكن أن تضطر إلى العودة للخضوع لعملية تنظيف القولون مرة أخرى.

كلما كانت الأمعاء أكثر نظافة، كلما كانت عملية تنظيف القولون أفضل

ينبغي تنظيف الأمعاء بالكامل من أجل الإعداد لعملية تنظيف قولون ناجحة. من فضلك اتبع إرشادات مقدم الخدمة الطبية. اشرب الكثير من الماء قبل البدء في العلاج وقم بتنفيذ الإعدادات كلها وفقاً للتعليمات.

الإعداد لعملية تنظيف القولون

تعليمات غذائية

المرحلة الأولى:

ما بين يومين وسبعة أيام قبل الخضوع للفحص، ينبغي عليك تناول أطعمة سهلة الهضم. يجب عليك تجنب تناول الحبوب الكاملة، والجوز، والبيذور بالإضافة إلى الأطعمة صعبة الهضم مثل فطر عيش الغراب، الهليون، البصل، الفلفل، الذرة، الفواكه النيئة أو الخضروات. **في الأربع والعشرين ساعة السابقة للخضوع للفحص**، لا تأكل أي أطعمة صلبة. فقط تناول **سوائل مصفاة. فيما يلي أمثلة للسوائل المصفاة:** ماء، ومشروبات طبية مهدئة، (غير حمراء)، وعصير تفاح، والمرقة، ومشروبات رياضية، ومشروبات غازية بدون عوامل تلوين قوية، وبيرة منخفضة الكحول، ومحلول جفاف يتم تناوله بالفم، (يتم الحصول عليه من الصيدليات دون وصفة طبية)، ومشروبات غذائية نقية، وماء محلي بعسل النحل، وقهوة، وشاي بدون لبن. **لا تشرب الماء فقط!**



بيكو بريبي® عبارة عن وصفة طبية تستخدم لتنظيف الأمعاء.

يتمتع دواء بيكو بريبي بنكهة البرتقال. بسبب دواء بيكو بريبي في إسهال لساعات عديدة. يعمل ذلك على تنظيف الأمعاء الأمر الذي يمكن الطبيب\الممرض من فحصك ورؤية أمعائك بوضوح.

تناول دواء بيكو بريبي®

المرحلة الرابعة:

كرر المرحلة الثانية قبل الخضوع لعملية التنظيف بفترة تتراوح بين أربع وست ساعات ساعات متباعدة التوقيتات التي كتبها الطبيب\الممرض في تعليماته. على الأقل، تناول ثلاثة أكواب من السائل النقي في الساعات القليلة التالية. إذا راودك شعور بالعطش، يمكنك الاستمرار في شرب السوائل المنقاة حتى قبل الخضوع لعملية تنظيف القولون بساعتين.

3x 250 مل

المرحلة الثالثة:

على الأقل، تناول خمس أكواب سعة 250 مل من السائل المنقى في خلال الساعات القليلة التالية.

5x 250 مل

المرحلة الثانية:

قم بحل الكيس الأول في 150 مل من الماء البارد و قم بالتقليب لمدة تتراوح بين 2-3 دقائق. اشرب المحلول قبل الخضوع لعملية تنظيف القولون بـ 10 ساعات 18- ساعة متباعدة التوقيتات التي كتبها الطبيب\الممرض في تعليماته.

3-2 دقائق

بعد الخضوع لعملية تنظيف القولون

بعد الفحص، سيقوم الطبيب\الممرض باطلاعك بما راوه في الأمعاء. في حالة أخذ أي عينات، ستتلقى النتائج في وقت لاحق.

أطلب من صديق أو أحد أفراد العائلة مرافقتك

يمكن أن تتناول دواء مهدئ قبل عملية الفحص. يعني ذلك أنك لن تكون قادرًا على القيادة بأمان ويمكن أيضا أن تكون العودة إلى المنزل من الصعوبة بمكان. لذا ينبغي عليك اصطحاب شخص ما يمكنه المجيء والعودة معك بعد الخضوع للفحص. يمكن أن يراودك شعور بالتضخم والانتفاخ في المعدة بعد الخضوع للفحص. ستتلاشى تلك الأعراض بعد ساعتين.



بعد العودة للمنزل

استرح لبقية يوم الخضوع للفحص. ابدأ بتناول الطعام مرة أخرى بداية بكميات صغيرة يمكنك زيادتها تدريجياً حتى العودة لمعدل تناول الطعام الطبيعي.



فضلاً تواصل مع الطبيب أو الممرض إن كانت لديك أي استفسارات حيال الفحص الذي ستخضع له أو كيفية الإعداد له.

يتوافر فيديو تعليمي يوضح كيفية خلط وتناول دواء بيكو بريبي عبر الموقع الإلكتروني

medicininstruktioner.se (باللغة السويدية)

يمكنك أيضاً قراءة وتنزيل نصائح ووصفات أطعمة سهلة الهضم لتتناولها قبل الخضوع للفحص من خلال الموقع.