

PATIENTINFORMATION

Till dig som fått Suliqua

Den här broschyren har vi skrivit till dig som har diabetes och har blivit ordinerad Suliqua (insulin glargin + lixisenatid) av din läkare. Det främsta målet med all diabetesbehandling är att få en så normal blodsockernivå som möjligt och samtidigt må bra.

Om det är något du undrar över vad gäller din diabetesbehandling, ska du aldrig tveka att fråga din sjuksköterska eller läkare.

Vad Suliqua är och vad det används för

Suliqua är ett injektionsläkemedel vid diabetes som innehåller två verk-samma ämnen:

- insulin glargin – ett slags lång-verkande insulin som hjälper till att reglera blodsockret hela dygnet
- lixisenatid – en sk GLP-1-analog som hjälper kroppen att tillverka eget insulin som svar på blodsocker höjningar, samt gör att sockret från maten tas upp långsammare.

Suliqua används vid behandling av diabetes typ 2 hos vuxna, för att reglera blodsockernivåerna då de är för höga. Det ges med metformin när andra läkemedel inte är tillräckliga för att kontrollera dina blodsockernivåer.

Dessa andra läkemedel kan innefatta diabetesläkemedel i tablettform (såsom metformin, sulfonylureidläke-medel) eller insulin.

Om du använder något annat diabetes-läkemedel, tala med din läkare om huruvida du ska sluta ta läkemedlet när du börjar använda Suliqua.



Hur du använder Suliqua

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Din läkare kanske säger att du ska använda en annan dos jämfört med din tidigare insulindos. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Beroende på din livsstil, resultatet av ditt blodsockertest och tidigare insulinbehandling kommer läkaren att berätta:

- Hur mycket Suliqua du kommer att behöva varje dag och vid vilken tidpunkt på dagen.
- När du ska kontrollera blodsockernivån och om du måste göra ett urintest.
- När du kan bli tvungen att öka eller minska dosen.

Din läkare kanske kommer att rekommendera dig att använda Suliqua tillsammans med andra läkemedel mot högt blodsocker.




Hur mycket du ska använda

Suliqua 100 enheter/ml + 33 mikrogram/ml förfylld injektionspenna:

- Den här pennan ger doser från 30 till 60 dossteg i en injektion, i steg om 1 dossteg.
- Varje dossteg du vrider fram innehåller 1 enhet insulin glargin och 0,33 mikrogram lixisenatid.

Din Suliqua-dos ges som dossteg. Injektionspennans doseringsfönster visar antalet dossteg av Suliqua som ska injiceras. Injicera inte en dos större än 60 dossteg.



När Suliqua ska injiceras

Använd Suliqua en gång dagligen, inom en timme före måltid. Injicera helst Suliqua före samma måltid varje dag, då du valt ut den lämpligaste måltiden. Injicera Suliqua i magen eller utsidan av låret. Glöm ej att variera stickställe.


Innan du injicerar Suliqua

- Följ alltid bruksanvisningen som medföljer denna bipacksedel.
- Om du inte följer alla anvisningar, kan du få för mycket eller för lite Suliqua.

För att undvika misstag: kontrollera alltid läkemedelsförpackningen och etiketten på injektionspennan före varje injektion för att försäkra dig om att du har rätt penna, i synnerhet om du använder mer än ett injektionsläkemedel. Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du har använt för stor mängd av Suliqua

Om du har injicerat för mycket av detta läkemedel, kan blodsockernivån bli låg (hypoglykemi). Kontrollera ditt blodsocker och ät mer mat för att förhindra att blodsockret blir för lågt.



När Suliqua ska injiceras

Om du har glömt att använda Suliqua

Om du har glömt en dos Suliqua eller om du inte har injicerat tillräckligt med insulin kan blodsockernivån bli för hög (hyperglykemi). Vid behov kan Suliqua injiceras före nästa måltid.

- Injicera inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.
- Ta inte två injektioner per dag.
- Kontrollera blodsockret och injicera sedan nästa dos vid den vanliga tidpunkten.



Hur Suliqua ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatumet som anges på kartongen och på pennans etikett efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Före första användning

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Får ej frysas eller förvaras i direktkontakt med frysack eller kylklamp. Förvara injektionspennan i yttre kartongen eftersom det är ljuskänsligt.

Efter första användning/reservpennor

Injektionspennan kan förvaras i maximalt 14 dagar utanför kylskåp, men vid högst 30°C. Kassera pennan efter denna tid.

Får ej läggas tillbaka i kylskåp och får ej frysas. Förvara injektionspennan i skydd mot direkt värme eller direkt ljus. Skyddslocket måste sättas tillbaka på injektionspennan efter varje injektion.

Lämna inte injektionspennan i en bil en ovanligt varm eller kall dag. Förvara inte injektionspennan med nål fastsatt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Övrigt

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.



Injektionspenna



Suliqua SoloSTAR® är en förfylld injektionspenna där dosen ställs in i steg om 1 enhet. Maxdosen är 60 enheter per injektion.



Suliqua® (insulin glargin + lixisenatid) R, F, A10AE54, 100 enheter/ml + 50 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna respektive 100 enheter/ml + 33 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna. **Indikation:** Suliqua är avsett för, i kombination med metformin, behandling av vuxna med diabetes typ 2 för att förbättra den glykemiska kontrollen när tillräcklig kontroll inte uppnåtts med metformin enbart eller i kombination med ett annat peroralt glukossänkande läkemedel eller basinsulin. **Varning och försiktighet:** Suliqua ska inte användas hos patienter med diabetes mellitus typ 1 eller vid behandling av diabetesketoacidosis. För ytterligare information se www.fass.se. **Förpackningar:** Suliqua SoloStar 3x3 ml pennor samt 5x3 ml pennor. Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén, februari 2017.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se



Noteringar

Frågor om våra diabetesprodukter:
020-52 68 87

Mer information om diabetes hittar du på www.insulin.se
Du kan också läsa om olika insuliner på www.fass.se

Läs bipacksedeln noggrant!