

# XYREM<sup>®</sup>

(natriumoxybat)

## Hvordan man tager Xyrem<sup>®</sup>

Din æske med Xyrem<sup>®</sup> (natriumoxybat) indeholder en flaske Xyrem<sup>®</sup> (natriumoxybat) oral opløsning, en flaskeadapter, en målesprøjte, to doseringsbægre med børnesikkert låg til forberedelse og opbevaring af dine to natlige doser og indlægssedlen for Xyrem<sup>®</sup> (natriumoxybat).




Fig 1.

Læs indlægssedlen for yderligere vigtig information før du tager dine første doser Xyrem<sup>®</sup> (natriumoxybat). Tag altid Xyrem<sup>®</sup> (natriumoxybat) nøjagtigt efter lægens anvisning. Kontakt lægen, hvis du har yderligere spørgsmål eller bekymringer vedrørende Xyrem<sup>®</sup> (natriumoxybat). Gør begge doser klar inden sengetid.

1. Flaskelåget fjernes ved at trykke det ned, mens det drejes mod uret (mod venstre). Når låget er fjernet, sættes flasken i opret stilling på et bord. Toppen af flasken er forseglet med plastikfolie, som skal fjernes, før flasken tages i brug første gang. Mens flasken holdes i opret stilling, indsættes flaskeadapteren i flaskehalsen. Det er kun nødvendigt at gøre dette første gang, flasken åbnes. Derefter kan adapteren efterlades i flasken til efterfølgende brug (se figur 2). 2013 UCB S.A., Belgium. Alle rettigheder reserveret




Fig 2.

2. Sæt derefter spidsen af målesprøjten ind midt i flaskens åbning, og tryk hårdt nedad (se figur 3).




Fig 3.

- 3.** Mens flasken og sprøjten holdes med den ene hånd, trækkes den foreskrevne dosis op med den anden hånd ved at trække i stemplet. BEMÆRK: Lægemidlet vil ikke løbe ind i sprøjten, medmindre flasken holdes i opret stilling (se figur 4).




Fig 4.

- 4.** Fjern sprøjten fra flaskens åbning. Tøm lægemidlet fra sprøjten ned i et af de medfølgende doseringsbægre ved at trykke på stemplet (se figur 5). Gentag dette for det andet doseringsbæger. Hæld derefter ca. 60 ml vand i hvert doseringsbæger – 60 ml er ca. 4 spiseskefulde (se figur 5).



Fig 5.

- 5.** Sæt de medfølgende låg på doseringsbægrene, og drej hvert låg med uret (mod højre), til det klikker og låser i den børnesikre stilling (se figur 6). Skyl sprøjten med vand.



Fig 6.

- 6.** Lige før du går i seng anbringes den anden dosis i nærheden af sengen. Det kan være nødvendigt at stille vækkeuret, så du er sikker på at vågne, når du skal tage den anden dosis tidligst 2½ time og senest 4 timer efter første dosis. Fjern låget fra det første doseringsbæger (se figur 7) ved at trykke den



børnesikre låsetap ned og drej låget mod uret (mod venstre). Drik hele den første dosis, mens du sidder i sengen, sæt låget på igen, og læg dig straks ned.

Fig 7.

- 7.** Når du vågner 2½ til 4 timer senere, fjernes låget fra det andet doseringsbæger. Mens du sidder i sengen, drikkes hele den anden dosis, lige før du lægger dig ned for at sove videre. Sæt låget på igen.

Læs indlægssedlen for Xyrem® (natriumoxybat) som ligger i æsken sammen med Xyrem® (natriumoxybat) og tal med din læge eller apotekspersonalet for at få yderligere detaljer om informationen i denne video-præsentation.

Denne information er en del af en risikostyringsplan, som er blevet anmodet fra det Europæiske lægemiddelagentur.



UCB Nordic A/S  
Edvard Thomsens Vej 14,7  
2300 København S  
Telefon: +45 32 462 400  
Email: info.ucbnordic@ucb.com