



# Ofte stillede spørgsmål, som patienter kan have til sikkerheden af Xyrem®

*Her er nogle spørgsmål, som du kan have når du tager Xyrem® (natriumoxybat). Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du har andre spørgsmål, og læs indlægssedlen, der følger med din medicin.*

## 1. Hvad er Xyrem® (natriumoxybat)?

Xyrem® er et oralt receptpligtigt lægemiddel til behandling af voksne, som:

- pludselig falder i søvn i løbet af dagen og på uventede tidspunkter (narkolepsi).
- oplever pludselig mathed eller lammede muskler i forbindelse med stærke følelser (katapleksi).

## 2. Må jeg drikke alkohol, når jeg tager Xyrem® (natriumoxybat)?

Nej, du må ikke drikke alkohol, når du tager Xyrem® (natriumoxybat). Virkningen af Xyrem® (natriumoxybat) kan forstærkes, og du kan opleve åndedrætsbesvær (respirationsdepression), som kan være dødelig. Du kan også opleve svækket tankegang og forvirring.

## 3. Hvad er de alvorlige bivirkninger af Xyrem® (natriumoxybat)?

### Åndedrætsbesvær (respirationsdepression)

Xyrem® (natriumoxybat) kan påvirke vejrtrækningen. Kontakt lægen, før du tager Xyrem® (natriumoxybat), hvis du har vejrtræknings- eller lungeproblemer. Du har også øget risiko for respirationsdepression, hvis du er overvægtig. Du bør ikke drikke alkohol, da alkohol også kan forøge risikoen for respirationsdepression. Respirationsdepression kan være alvorlig og endda dødelig.

## Depression og selvmordstanker

Hvis du føler dig deprimeret eller har tanker om at gøre skade på dig selv, mens du tager Xyrem® (natriumoxybat), skal du straks fortælle det til din læge. Du skal også fortælle det til din læge, hvis du tidligere har haft en depression.

## Nedsat bevidsthed

Da Xyrem® (natriumoxybat) virker direkte på hjernen kan det forårsage dødsghed og nedsætte din bevidsthed. Dette kan føre til koma og kan være dødelig. Det er vigtigt, at du ikke drikker alkohol, mens du tager Xyrem® (natriumoxybat). Tag ikke andre lægemidler, som forårsager dødsghed. Kør ikke bil og betjen ikke maskiner inden for 6 timer efter indtagelse af Xyrem® (natriumoxybat).

## Krampeanfald

Xyrem® (natriumoxybat) kan forårsage krampeanfald. Fortæl det til din læge, hvis du tidligere har haft krampeanfald, før du tager Xyrem® (natriumoxybat).

## Afhængighed/forkert brug/misbrug

Det aktive stof i Xyrem® (natriumoxybat) er gamma-hydroxybutyrat (GHB). GHB er et stof, som er blevet misbrugt og brugt forkert. Din læge vil derfor spørge dig, om du nogensinde har misbrugt nogen form for medicin. Misbrug og forkert brug af Xyrem® (natriumoxybat) er farlig og kan have dødelig konsekvens.

Disse er ikke alle bivirkninger af Xyrem® (natriumoxybat). Tal med din læge og få medicinsk rådgivning om bivirkninger.

## 4. Er Xyrem® (natriumoxybat) sikkert at tage sammen med anden medicin?

Som ved al anden medicin, er det meget vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du tager anden medicin. Dette gælder også medicin, som er købt uden recept. Xyrem® (natriumoxybat) bør ikke tages sammen med medicin, som forårsager dødsghed eller medicin, som hæmmer aktiviteten i centralnervesystemet. Sørg for at fortælle lægen, hvis du tager medicin, der påvirker centralnervesystemets aktivitet (medicin mod depression, valproat, topiramid, phenytoin eller ethosuximid).

Bed sundhedspersonalet om Xyrem® (natriumoxybat) Patient informationskortet, som du kan have med dig til at minde dig om brugen af Xyrem® (natriumoxybat). Vis dette informationskort til alle dine læger, så de ved, at du tager Xyrem® (natriumoxybat). Dette er særlig vigtigt, hvis de udskriver anden medicin til dig.

## 5. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ved et uheld tager mere end den ordinerede dosis (overdosis)?

Søg straks akut hjælp, hvis du har taget for meget Xyrem® (natriumoxybat).

Symptomerne ved at tage for meget Xyrem® (natriumoxybat) kan omfatte ophidselse, forvirring, svækket bevægelighed, svækket vejrtrækning, sløret syn, voldsomme svedeture, hovedpine, opkastning og nedsat bevidsthed, som kan føre til koma og krampeanfald. Hvis du medbringer medicinflasken med etiketten (også selvom den er tom), vil det hjælpe sundhedspersonalet til at behandle dine symptomer.

## 6. Hvad sker der, hvis jeg pludselig holder op med at tage Xyrem® (natriumoxybat)?

Du kan opleve abstinenssymptomer, hvis du pludselig holder op med at tage Xyrem® (natriumoxybat). Du kan opleve, at katapleksianfaldene vender tilbage og du kan opleve søvnløshed, hovedpine, angst, svimmelhed, problemer med at sove, søvnighed, hallucinationer og unormal tankevirk-somhed

## 7. Er der anden vigtig information, som jeg skal vide om at tage Xyrem (natriumoxybat)?

- Giv ikke Xyrem® (natriumoxybat) til andre.
- Tag kun den dosis, som din læge har foreskrevet. Tal med din læge, hvis du synes, at din dosis skal ændres.
- Overhold altid et 2-timers tidsinterval mellem sidste måltid og indtagelse af Xyrem®.
- Opbevar altid Xyrem® (natriumoxybat) på et sikkert sted i den originale beholder.
- Opbevar Xyrem® (natriumoxybat) utilgængeligt for børn.
- Aflever ikke anvendt lægemiddel til apoteket.
- Hvis du oplever usædvanlige symptomer, såsom mærkelige tanker, herunder tanker om at skade andre, under behandling med Xyrem®, skal du straks kontakte din læge.

# XYREM®

UCB, Xyrem, Ofte stillede spørgsmål, v. 2.2

© Copyright UCB Biopharma SPRL 2017, Alle rettigheder forbeholdt

Denne information er en del af risikostyringsplanen, som er påkrævet af  
Det Europæiske Lægemiddelagentur



UCB Nordic A/S  
Edvard Thomsens Vej 14,7  
2300 København S  
Telefon: +45 32 462 400  
Email: [info.ucbnordic@ucb.com](mailto:info.ucbnordic@ucb.com)