

Finska

TIETOA POTILAALLE

# Tietoa teille, joille on määrätty Suliqua-lääkitys

Olemme kirjoittaneet tämän esitteen teille, joilla on diabetes ja joille lääkäri on määrännyt Suliqua-lääkityksen (glargiini-insuliini+liksisenatidi). Kaikkien diabeteshoitojen tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman normaali verensokeritaso ja samalla myös terve olo.

Jos teillä on kysyttävää diabeteshoidostanne, älkää epäröikö keskustella sairaanhoitajan tai lääkärin kanssa.

# Mitä Suliqua on ja mihin sitä käytetään


Suliqua on pistoksena annettava diabeteslääke, joka sisältää kahta vaikuttavaa ainetta:

- glargiini-insuliini – pitkävaikutteinen insuliini, joka auttaa säätelemään verensokeria ympäri vuorokauden
- liksisenatidi – niin kutsuttu GLP-1-analogi, joka auttaa kehoa tuottamaan omaa insuliiniaan vasteena verensokerin nousuun sekä hidastamaan ruoasta saadun sokerin imeytymistä.

Suliqua-lääkettä käytetään aikuisilla tyyppin 2 diabeteksen hoitoon säätelemään verensokeritasoja, kun ne ovat liian korkeat. Se annetaan yhdessä metformiinin kanssa, kun muut lääkkeet eivät riitä säätelemään verensokeritasoja.

Näihin muihin lääkkeisiin saattaa kuulua diabeteslääkkeitä tablettien (esimerkiksi metformiini ja sulfonyyliurealääkkeet) tai insuliinin muodossa.

Jos käytätte jotakin muuta diabeteslääkettä, keskustelkaa lääkärinne kanssa, tulisiko sen käyttö lopettaa silloin, kun aloitatte Suliqua-lääkkeen käyttämisen.



# Miten Suliqua-lääkettä käytetään

Käyttäkää tätä lääkettä aina lääkärinne antamien ohjeiden mukaisesti. Lääkärinne saattaa määrätä teille erilaisen annoksen verrattuna aikaisempaan insuliiniannokseenne. Keskustelkaa lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa, jos olette epävarma.

Riippuen elämäntyylistänne, verensokeritestinne tuloksista ja aikaisemmasta insuliinihoidosta, lääkäri kertoo teille:

- kuinka paljon Suliqua-lääkettä tarvitsette päivittäin ja mihin aikaan
- milloin verensokeritaso tulee tarkastaa ja tuleeko teidän antaa virtsanäyte
- milloin teidän täytyy mahdollisesti nostaa tai laskea annostanne.

Lääkärinne saattaa suositella teille Suliqua-lääkkeen käyttämistä yhdessä muiden korkean verensokerin hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kanssa.




# Kuinka paljon lääkettä tulee käyttää

Suliqua 100 yksikköä/ml + 33 mikrogrammaa/ml  
esitäytetty injektio kynä:

- Tämä kynä antaa annoksia väliltä 30–60 annosaskelmaa yhdessä injektiossa, yhden annosaskelman kokoisina askelmina.
- Jokainen eteenpäin kiertämänne annosaskelma sisältää 1 yksikön glargiini-insuliinia ja 0,33 mikrogrammaa liksisenatidia.

Suliqua-annoksenne annetaan annosaskelmittain. Injektio kynän annosikkuna näyttää, kuinka monta annosaskelmaa Suliqua-lääkettä pistetään. Älkää pistäkö suurempaa kuin 60 annosaskelman annosta.



# Milloin Suliqua-lääkettä pistetään

Käyttäkää Suliqua-lääkettä kerran päivässä, yhden tunnin sisällä ennen ruokailua. Suliqua-lääke tulisi pistää mielellään ennen samaa ateriaa joka päivä, kun olette valinnut sopivimman aterian. Pistäkää Suliqua-lääke vatsaan tai reiden ulkosyrjään. Älkää unohtako vaihdella pistoskohtaa.


## Ennen Suliqua-lääkkeen pistämistä

- Seuratkaa aina tämän pakkausselosteen mukana tulevia ohjeita.
- Jos ette seuraa kaikkia ohjeita, saatatte saada liikaa tai liian vähän Suliqua-lääkettä.

Virheiden välttämiseksi: tarkastakaa aina lääkepakkaus ja injektioikynän etiketti ennen jokaista pistosta varmistaaksenne, että teillä on käytössä oikea kynä, varsinkin, jos käytätte useampaa kuin yhtä injektio-lääkitystä. Keskustelkaa lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olette epävarma.

## Jos olette pistänyt liian suuren annoksen Suliqua-lääkettä

Jos olette pistänyt liian suuren annoksen tätä lääkettä, verensokeritasonne saattaa laskea (hypoglykemia). Tarkastakaa verensokerinne ja syökää lisää ruokaa estääksenne verensokerinne liiallisen laskemisen.



# Milloin Suliqua-lääkettä pistetään

## **Jos olette unohtanut käyttää Suliqua-lääkettä**

Jos olette unohtanut Suliqua-annoksen tai jos ette ole pistänyt tarpeeksi insuliinia, verensokeritasonne saattaa nousta liian korkeaksi (hyperglykemia). Suliqua-lääkettä voi tarvittaessa pistää ennen seuraavaa ateriaa.

- Älkää pistäkö kaksinkertaista annosta korvataksenne unohtuneen annoksen.
- Älkää pistäkö kahta pistosta päivässä.
- Tarkastakaa verensokeri ja pistäkää sitten seuraava annos normaaliin aikaan.



# Suliqua-lääkkeen säilyttäminen

Säilyttäkää nämä lääkkeet poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Käyttäkää ennen viimeistä käyttöpäivämäärää, joka on merkitty pakkaukseen ja kynän etikettiin tekstin ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkityn kuukauden viimeinen päivä.

## **Ennen ensimmäistä käyttöä**

Säilyttäkää jääkaapissa (2 °C – 8 °C).

Lääke ei saa jäätyä eikä sitä saa säilyttää suorassa kosketuksessa pakastuslokeron tai kylmäelementin kanssa.

Säilyttäkää injektioskynä ulommassa pakkauksessaan, sillä se on herkkä valolle.

## **Ensimmäisen käytön jälkeen / varakynät**

Injektioskynän voi säilyttää poissa jääkaapista mutta alle 25 °C:ssa enintään 28 päivää. Hävittäkää kynä tämän ajan jälkeen.

Älkää laittako lääkettä takaisin jääkaappiin. Se ei saa myöskään jäätyä. Säilyttäkää injektioskynä suoralta auringonvalolta ja lämmöltä suojattuna. Laittakaa suojakorkki takaisin injektioskynään jokaisen piston jälkeen.

Älkää jättäkö injektioskynää autoon epätavallisen kuumana tai kylmänä päivänä. Säilyttäkää injektioskynä ilman neulaa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysykää apteekkihenkilökunnalta neuvoja käyttämättömien lääkkeiden hävittämiseksi. Näillä toimenpiteillä pyritään suojelemaan ympäristöä.



# Muuta


## **Haittavaikutuksista raportointinen**

Jos koette haittavaikutuksia, keskustelkaa lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa. Tämä koskee myös mitä tahansa muita haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä esitteessä.

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voitte auttaa lisäämään tietoa lääkkeen turvallisuudesta.



# Injektiokynä



**Suliqua SoloSTAR®** on esitäytetty injektiokynä, jossa annos asetetaan 1 yksikön askelmissa. Maksimiannos on 60 yksikköä pistosta kohden.



**Suliqua®** (glargiini-insuliini+liksisenatidi) R, F, A10AES4, 100 yksikköä/ml + 50 mikrogrammaa/ml, neste pistosta varten, liuos esitäytetyssä injektiokynässä ja 100 yksikköä/ml + 33 mikrogrammaa/ml, neste pistosta varten, liuos esitäytetyssä injektiokynässä. **Käyttöaihe:** Suliqua-lääkettä käytetään, yhdessä metformiinin kanssa, aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoitoon parantamaan verensokeritasojen hallintaa, kun riittävää hallintaa ei ole saavutettu pelkästään metformiinilla, tai yhdistettynä toiseen suun kautta otettavaan glukoosia alentavaan lääkitykseen tai perusinsuliiniin. **Varoitukset ja varotoimet:** Suliqua-lääkettä ei tule käyttää tyypin 1 diabetes mellitusta sairastavilla potilailla tai diabeettisen ketoasidoosin hoidossa. Lisätietoja löydätte osoitteesta [www.fass.se](http://www.fass.se). **Pakkaus:** Suliqua SoloStar 3x3 ml kynät ja 5x3 ml kynät. Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, puh: +46 8 634 50 00, [www.sanofi.se](http://www.sanofi.se). Jos teillä on kysyttävää lääkkeistämme, ottakaa yhteyttä: [infoavd@sanofi.com](mailto:infoavd@sanofi.com). Valmisteyhteenvedon viimeisimmän tarkastuksen päivämäärä: Helmikuu 2017.

▼ Tähän lääkevalmisteeseen sovelletaan pidennettyä valvontaa. Lisätietoja löydätte osoitteesta [www.fass.se](http://www.fass.se)



# Huomioita

---

---

---

---

---

---

---

---

Kysymyksiä diabetest tuotteistamme:  
**020-52 68 87**

Löydätte lisätietoja diabeteksesta osoitteesta [www.insulin.se](http://www.insulin.se)  
Voitte myös lukea lisää erilaisista insuliineista osoitteessa [www.fass.se](http://www.fass.se)

Lukekaa pakkausseloste huolellisesti!