

اطلاعات بیمار
برای شما که
Suliqua
برایتان تجویز شده است

این بروشور را برای آن دسته از افراد مبتلا به دیابت تهیه کرده‌ایم که پزشک برایشان Suliqua (گلازژین انسولین + لیگزیناتید) تجویز کرده است. هدف اصلی همه درمان‌های دیابت، دستیابی به طبیعی‌ترین میزان قند خون ممکن و در عین حال ایجاد حس تندرستی در بیمار است.

اگر درباره درمان دیابت خود سؤالی دارید، حتماً آن را با پرستار یا پزشک در میان بگذارید.

Suliqua چیست و به چه منظور استفاده می‌شود


از Suliqua به‌عنوان درمان دیابت نوع 2 در بزرگسالان استفاده می‌شود تا میزان قند خون بالای آنها تنظیم گردد. هنگامی که داروهای دیگر برای کنترل قند خون شما کافی نباشند، این دارو همراه با متفورمین داده می‌شود.

داروهای دیگر ممکن است شامل داروهای دیابت به شکل قرص (مانند متفورمین، داروهای سولفونیل اوره) یا انسولین باشند.

اگر از داروهای دیابتی دیگری استفاده می‌کنید، در مورد اینکه آیا باید در هنگام شروع استفاده از Suliqua مصرف آن دارو را متوقف کنید یا خیر با پزشک خود صحبت نمایید.

Suliqua یک داروی تزریقی برای دیابت است که حاوی دو ماده فعال است:

- گلازژین انسولین - یک نوع انسولین طولانی اثر است که به تنظیم قند خون در طی 24 ساعت روز کمک می‌کند
- لیگزپسناتید - یک ماده به اصطلاح مشابه GLP-1 است که به بدن کمک می‌کند در پاسخ به افزایش قند خون، انسولین تولید کند و باعث می‌شود قند غذا دیرتر جذب شود.



نحوه استفاده از Suliqua

همیشه این دارو را طبق دستور پزشکتان مصرف کنید. ممکن است پزشکتان از شما بخواهد دوز متفاوتی را نسبت به دوز انسولین قبلی خود استفاده کنید. در صورتی که مطمئن نیستید، با پزشک، مسئول داروخانه یا یک پرستار مشورت کنید.

پزشک با توجه به شیوه زندگی، نتیجه آزمایش قند خون و درمان انسولین قبلی‌تان، به شما می‌گوید:

- هر روز باید چه مقدار Suliqua را و در چه زمانی از روز مصرف کنید.
 - چه زمانی قند خون خود را بررسی کنید و اینکه آیا لازم است آزمایش ادرار انجام دهید یا خیر.
 - چه زمانی لازم است مجبور شوید دوز خود را افزایش یا کاهش دهید.
- ممکن است پزشکتان به شما توصیه کند از Suliqua به همراه سایر داروهای مربوط به قند خون بالا استفاده کنید.



چقدر باید مصرف کنید

قلم تزریق از پیش پر شده Suliqva 100 واحد/میلی لیتر + 33 میکروگرم/میلی لیتر:

- این قلم در هر تزریق از 30 تا 60 گام دوز را در گام‌های 1 دوز به ازای هر گام انجام می‌دهد.
- هر گام دوز که به جلو می‌پیچانید حاوی 1 واحد گلازژین انسولین و 0.33 میکروگرم لیگزیسناتید است.


دوز Suliqva ی شما به صورت گام‌های دوز تزریق می‌شود. پنجره دوز روی قلم تزریق تعداد گام‌های دوز Suliqva که باید تزریق گردد را نشان می‌دهد. میزان دوز بیشتر از 60 گام دوز را تزریق نکنید.



چه زمانی باید Suliqua را تزریق کرد

اگر بیش از حد Suliqua استفاده کرده‌اید

اگر این دارو را بیش از حد تزریق کرده‌اید، ممکن است میزان قند خونتان کم شود (هیپوگلیسمی). قند خون خود را بررسی کنید و غذای بیشتری بخورید تا قند خونتان خیلی کم نشود.



از Suliqua یک بار در روز و ظرف یک ساعت قبل از غذا استفاده کنید. بهتر است Suliqua هر روز قبل از یک وعده غذایی مشخص تزریق شود که در این صورت باید مناسب‌ترین وعده غذایی را انتخاب کنید. Suliqua را به شکم یا قسمت بیرونی ران تزریق کنید. فراموش نکنید که محل تزریق را تغییر دهید.

قبل از تزریق Suliqua

- همیشه دستورالعمل‌های همراه با این برگه اطلاعات بیمار را رعایت کنید.
- اگر تمام دستورالعمل‌ها را رعایت نکنید، ممکن است مقدار خیلی زیاد یا خیلی کمی Suliqua دریافت نمایید.

برای جلوگیری از بروز اشتباه: قبل از هر تزریق، جعبه دارو و برچسب روی قلم تزریق را بررسی کنید تا مطمئن شوید که قلم صحیح را در اختیار داشته باشید، مخصوصاً اگر از بیش از یک داروی تزریقی استفاده می‌کنید. چنانچه مطمئن نیستید، از یک پزشک یا مسئول داروخانه سؤال کنید.

چه زمانی باید Suliqua را تزریق کرد

- دو دوز همزمان را برای جبران دوز فراموش شده تزریق نکنید.
- در روز دو بار تزریق انجام ندهید.
- قند خون را بررسی کنید و سپس دوز بعدی را در زمان معمول تزریق نمایید.

اگر مصرف Suliqua را فراموش کرده‌اید

اگر یک دوز Suliqua را فراموش کرده‌اید یا اگر انسولین کافی تزریق نکرده باشید، ممکن است میزان قند خون بیش از حد بالا باشد (هیپرگلیسمی). در صورت نیاز، Suliqua را قبل از وعده غذایی بعدی تزریق کنید.



نحوه نگهداری Suliqua

این دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.

نباید دوباره در یخچال قرار داده شود و نباید یخ بزند. قلم تزریق را در برابر گرمای مستقیم یا نور مستقیم خورشید محافظت کنید. پس از هر بار تزریق، باید درپوش محافظ را روی قلم تزریق قرار دهید.

قبل از تاریخ انقضا که روی بسته و بر روی برچسب روی قلم بعد از عبارت "EXP" ذکر شده است، مصرف کنید. تاریخ انقضا آخرین روز ماه ذکر شده است.

قلم تزریق را در روزی که به شکلی غیرعادی گرم یا سرد است در داخل خودرو نگذارید. قلم تزریق را در حالتی که سوزن به آن متصل است، نگهداری نکنید.

قبل از اولین استفاده

در یخچال نگهداری کنید (2 تا 8 درجه سانتی‌گراد). نباید یخ بزند یا در تماس مستقیم با محفظه فریزر یا در بخش فریزر نگهداری شود. قلم تزریق را در جعبه آن نگه دارید زیرا به نور حساس است.

داروها نباید در فاضلاب ریخته شده یا جزو زباله‌های خانگی دور انداخته شوند. از کارکنان داروخانه بپرسید داروهایی را که دیگر مورد استفاده قرار ندارند چگونه دور بریزید. این اقدامات برای حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شده است.

پس از اولین استفاده/قلم‌های یدکی

قلم تزریق را حداکثر 28 روز می‌توان در خارج از یخچال نگهداری کرد به شرطی که دما کمتر از 25 درجه سانتی‌گراد باشد. بعد از این مدت، قلم را دور بیندازید.

سایر

گزارش دادن عوارض جانبی

اگر دچار عوارض جانبی شدید، با پزشک، مسئول داروخانه یا پرستار صحبت کنید. این مسئله در مورد هر گونه عوارض جانبی که در این برگه اطلاعات ذکر نشده نیز صادق است.

با گزارش دادن عوارض جانبی می‌توانید به افزایش اطلاعات در مورد ایمنی این دارو کمک کنید.



قلم تزریق



Suliqua SoloSTAR® یک قلم تزریق از پیش پر شده است که مقدار دوز آن با گام‌های 1 واحدی تنظیم می‌شود. حداکثر دوز، 60 واحد در هر نوبت تزریق است.

Suliqua® (کلارژین انسولین + لیگزیمینتاید) 4R، 4F، 4A10AE54، 100 واحد/میلی‌لیتر + 50 میکروگرم/میلی‌لیتر، محلول در یک قلم تزریق از پیش پر شده و 100 واحد/میلی‌لیتر + 33 میکروگرم/میلی‌لیتر مایع برای تزریق، محلول در یک قلم تزریق از پیش پر شده. موارد مصرف: Suliqua به همراه متفورمین برای درمان بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 در نظر گرفته شده است تا کنترل گلیسمی را بهبود بخشد، در صورتی که کنترل کافی تنها با متفورمین یا در ترکیب با یکی دیگر از داروهای کاهش‌دهنده قند خون یا انسولین پایه حاصل نشود. هشدارها و احتیاطها: از Suliqua نباید در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 یا در درمان کتواسیدوز دیابتی استفاده شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به: www.fass.se. بسته‌بندی: قلم‌های 3x3 میلی‌لیتر و قلم‌های 5x3 میلی‌لیتر Suliqua SoloStar. Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm. تلفن: +46 8 634 50 00. www.sanofi.se. اگر هرگونه سؤالی در مورد داروهای ما دارید، لطفاً با این آدرس تماس بگیرید: infoavd@sanofi.com. تاریخ آخرین بازبینی خلاصه‌ای از ویژگی‌های محصول: فوریه 2017.

▼ این دارو مشمول نظارت اضافی است. برای کسب اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به: www.fass.se

یادداشت‌ها
