

Polska



INFORMACJA DLA PACJENTA

Dla osób, którym przepisano preparat Suliqua



Opracowaliśmy niniejszą broszurę dla osób, które cierpią na cukrzycę i którym lekarz przepisał preparat Suliqua (insulina glargine + liksysenatyd). Głównym celem każdego leczenia cukrzycy jest osiągnięcie poziomu cukru jak najbardziej zbliżonego do stanu normalnego przy jednoczesnym zachowaniu dobrego samopoczucia.

Jeśli będzie Pan/Pani miał/miała jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące leczenia cukrzycy, proszę omówić je ze swoją pielęgniarką lub lekarzem.

Co to jest lek Suliqua i w jakim celu się go stosuje?


Suliqua to lek do wstrzykiwania stosowany w leczeniu cukrzycy, zawierający dwie substancje aktywne:

- insulinę glargine – rodzaj długotrwale działającej insuliny, która pomaga regulować poziom cukru we krwi przez całą dobę;
- liksyzenatyd – tzw. analog GLP-1, który pomaga organizmowi wytwarzać własną insulinę w odpowiedzi na wzrost poziomu cukru we krwi i powoduje, że cukier z pożywienia jest wchłaniany wolniej.

Preparat Suliqua stosowany jest jako lek w przypadku cukrzycy typu 2 u dorosłych w celu regulowania zbyt wysokich poziomów cukru we krwi. Podaje się go wraz z metforminą, gdy działanie innych leków mających kontrolować poziom cukru we krwi jest niewystarczające.

Lekami tymi mogą być leki stosowane w leczeniu cukrzycy w formie tabletek (zawierające metforminę czy pochodne sulfonilomocznika) lub insuliny.

Jeśli przyjmuje Pan/Pani inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy, proszę porozmawiać ze swoim lekarzem o tym, czy powinien/powinna Pan/Pani przestać je przyjmować, jeśli rozpocznie Pan/Pani przyjmowanie preparatu Suliqua.



Jak stosować preparat Suliqua?

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z instrukcjami podanymi przez lekarza. Pana/Pani lekarz może zalecić stosowanie innej dawki w porównaniu do poprzednio stosowanej dawki insuliny. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, personelem apteki lub pielęgniarką.

W zależności od stylu życia, wyników badań poziomu cukru we krwi oraz poprzedniego leczenia insulinowego lekarz poinformuje Pana/Panią:

- o dawce Suliqua, jaką należy przyjmować każdego dnia i o porze jej przyjmowania;
- o terminie kontroli poziomu cukru we krwi i ewentualnej konieczności wykonania badania moczu;
- gdy pojawi się potrzeba zwiększenia lub zmniejszenia dawki.

Pana/Pani lekarz może zalecić przyjmowanie preparatu Suliqua wraz z innym lekiem stosowanym w przypadku wysokiego poziomu cukru we krwi.




Jaką dawkę należy stosować?

Wstrzykiwacz z ampulką Suliqua 100 jednostek/ml
+ 33 mikrogramy/ml

- Wstrzykiwacz ten służy do podawania jednorazowo od 30 do 60 dawek, w odstępach regulowanych co 1 dawkę.
- Każda pojedyncza dawka zawiera 1 jednostkę insuliny glargine oraz 0,33 mikrograma liksysenatydu.

Doza preparatu Suliqua jest regulowana. Okienko dozowania na wstrzykiwaczu pokazuje liczbę dawek preparatu Suliqua. Nie należy wstrzykiwać dozy większej niż 60 dawek.



Kiedy wstrzykiwać preparat Suliqua?

Należy stosować preparat Suliqua raz dziennie, w ciągu godziny przed spożyciem posiłku. Preparat Suliqua powinno się stosować codziennie przed tym samym, najdogodniejszym dla siebie, posiłkiem. Preparat Suliqua należy wstrzyknąć w brzuch lub zewnętrzną stronę uda. Należy pamiętać o zmianie miejsc wstrzykiwania.


Przed wykonaniem wstrzyknięcia preparatu Suliqua

- Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej ulotce dla pacjenta.
- Jeśli nie będzie Pan/Pani postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami, może Pan/Pani przyjąć zbyt dużo lub zbyt mało preparatu Suliqua.

By uniknąć pomyłek: należy zawsze sprawdzać informacje na opakowaniu i etykiecie wstrzykiwacza przed każdym wstrzyknięciem, aby upewnić się, że użyty zostanie odpowiedni wstrzykiwacz, zwłaszcza w sytuacji, gdy stosuje Pan/Pani więcej niż jeden lek do wstrzykiwania. W razie wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem lub personelem apteki.

Przyjęcie zbyt dużej liczby dawek Suliqua

Jeśli przyjął/przyjęła Pan/Pani zbyt dużo tego leku, poziom cukru we krwi może się obniżyć (hipoglikemia). Należy sprawdzić poziom cukru we krwi i zjeść więcej pokarmów, by zapobiec jego zbyt niskiemu poziomowi.



Kiedy wstrzykiwać preparat Suliqua?

Ominięcie przyjęcia preparatu Suliqua

Jeśli zapomni Pan/Pani przyjąć dozę preparatu Suliqua lub nie wstrzyknie wystarczającej ilości insuliny, poziom cukru we krwi może wzrosnąć zbyt wysoko (hiperglikemia). W razie potrzeby można wstrzyknąć preparat Suliqua przed kolejnym posiłkiem.

- Nie należy wstrzykiwać podwójnej dozy, by zrekompensować pominętą dozę.
- Nie należy przyjmować dwóch wstrzyknięć na dobę.
- Należy sprawdzić poziom cukru, a następnie wstrzyknąć kolejną dozę o zwykłej porze.



Jak przechowywać preparat Suliqua?

Należy przechowywać ten lek w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek zużyć do daty przydatności, która znajduje się na opakowaniu i etykiecie wstrzykiwacza po literach „EXP”. Data przydatności do użycia oznacza ostatni dzień wskazanego miesiąca.

Przed pierwszym użyciem

Przechowywać w lodówce (2°C-8°C).

Preparatu nie wolno zamrażać ani przechowywać w bezpośrednim kontakcie z komorą zamrażarki lub wkładem do zamrażarki.

Należy przechowywać wstrzykiwacz w kartonie, ponieważ jest on wrażliwy na działanie światła.

Po pierwszym użyciu/dodatkowe wstrzykiwacze

Wstrzykiwacz można przechowywać przez maksymalnie 28 dni poza lodówką, ale w temperaturze poniżej 25°C. Po tym czasie należy wyrzucić wstrzykiwacz.

Nie wolno przechowywać preparatu z tyłu lodówki i nie wolno go zamrażać. Chronić wstrzykiwacz przed bezpośrednim działaniem ciepła lub światła słonecznego. Nasadka ochronna musi zostać nałożona na wstrzykiwacz po każdym wstrzyknięciu.

Nie zostawiać wstrzykiwacza w samochodzie w skrajnie gorące lub zimne dni. Nie przechowywać wstrzykiwacza z zamocowaną igłą.

Leków nie wolno wyrzucać do ścieków lub odpadów w gospodarstwie domowym. Należy zapytać personel apteki o to, w jaki sposób utylizować nieużywane leki. Środki te są podejmowane, by chronić środowisko.

Inne


Zgłaszanie skutków ubocznych

Jeśli doświadczy Pan/Pani skutków ubocznych, proszę porozmawiać z lekarzem, personelem apteki lub pielęgniarką. Dotyczy to również wszelkich skutków ubocznych niewymienionych w niniejszej ulotce.

Zgłaszając skutki uboczne, może Pan/Pani przyczynić się do uzyskania nowych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.



Wstrzykiwacz



Suliqua SoloSTAR® to wstrzykiwacz z ampułką, którego dżo regulowana jest w odstępnch co 1 jednostkę. Maksymalna dżo to 60 jednostek na wstrzyknięcie.

Suliqua® (insulina glargine + liksysenatyd) R, F, A10AE54, 100 jednostek/ml + 50 mikrogramów/ml, plyn do wstrzykiwania, roztwór we wstrzykiwaczu z ampułką oraz 100 jednostek/ml + 33 mikrogramy/ml plyn do wstrzykiwania, roztwór we wstrzykiwaczu z ampułką. **Wskazanie:** Suliqua, w skojarzeniu z meforminą, przeznaczona jest do leczenia cukrzycy typu 2 u osób dorosłych w celu poprawy kontroli glikemicznej w sytuacji braku dostatecznej kontroli w przypadku zastosowania metforminy w monoterapii lub w skojarzeniu z innym dostnym lekiem obniżającym poziom glukozy lub podstawową dawką insuliny. **Ostrzeżenia:** Preparatu Suliqua nie można stosować u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub w leczeniu kwasicy ketonowej. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.fass.se. **Opakowanie:** Wstrzykiwacze Suliqua SoloStar 3x3 ml oraz 5x3 ml. Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Sztokholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące naszych leków, prosimy o kontakt: infoavd@sanofi.com. Data ostatniej weryfikacji podsumowania charakterystyki produktu: luty 2017 r.

▼ Ten lek podlega szczegółowej obserwacji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.fass.se

Uwagi

Pytania dotyczące naszych
produktów dla osób
cierpiących na cukrzycę:
020-52 68 87

Więcej informacji o cukrzycy dostępnych jest na stronie internetowej: www.insulin.se

Opis różnych rodzajów insuliny znajduje się na stronie internetowej: www.fass.se

Należy uważnie przeczytać ulotkę z informacjami dla pacjenta!