

Turkiska

HASTA BİLGİLERİ
Suliqua kullananlar için

Bu broşür, diyabeti olan ve doktor tarafından Suliqua (insülin glarjin + liksisenatid) verilen kişi olarak size yönelik hazırlanmıştır. Tüm diyabet tedavilerinin öncelikli amacı, mümkün olduğunca normal olan kan şekeri düzeyine ulaşmak ve aynı zamanda sağlıklı hissetmektir.

Diyabet tedavinize dair herhangi bir sorunuz olması halinde asla hemşireniz veya doktorunuzla görüşme konusunda tereddüt etmeyin.

Suliqua nedir ve ne için kullanılır

Suliqua, iki aktif madde içeren diyabet için kullanılan bir enjeksiyon ilacıdır:

- insülin glarjin – günde 24 saat boyunca kan şekeri düzenlenmesine yardımcı olan uzun etkili bir insülin türü
- liksisenatid – vücudun kan şekeri artışına tepki olarak ve gıdadan alınan şekerin daha yavaş absorbe edilmesini sağlamak için kendi insülinini üretmesine yardımcı olan GLP-1 olarak adlandırılan analog.

Suliqua, kan şekeri düzeyleri çok yüksek olduğunda kan şekerini düzenlemek için yetişkinlerde tip 2 diyabet tedavisi olarak kullanılır. Diğer ilaçlar kan şekeri düzeylerinizi kontrol etmek için yeterli olmadığında, metformin ile birlikte verilir.

Bu diğer ilaçlar; tabletler (metformin, sülfonilüre ilaçları gibi) veya insülin formunda diyabet ilaçlarını içerebilir.

Başka bir diyabet ilacı kullanıyorsanız, Suliqua kullanmaya başladığınızda bu ilacı almayı bırakıp bırakmamanız hakkında doktorunuzla konuşun.



Suliqua kullanımı

Bu ilacı her zaman doktorunuzun talimatlarına uygun olarak kullanın. Doktorunuz size daha önceki insülin dozunuza kıyasla başka bir doz kullanmanızı söyleyebilir. Emin değilseniz bir doktora, eczane personeline veya bir hemşireye danışın.

Yaşam tarzınıza, kan şekeri testinizin sonucuna ve önceki insülin tedavinize bağlı olarak, doktor size şunları söyleyecektir:

- Her gün ve günün hangi saatinde ne kadar Suliqua'ya ihtiyacınızın olacağını.
- Kan şekeri düzeyinizi ne zaman kontrol edeceğinizi ve idrar testinizi yaptırmanız gerekip gerekmediğini.
- Dozunuzu ne zaman artırmaz veya azaltmanız gerekebileceğini.

Doktorunuz size yüksek kan şekeri için diğer ilaçlarla birlikte Suliqua kullanmanızı tavsiye edebilir.




Kullanmanız gereken miktar

Suliqua 100 birim/ml + 33 mikrogram/ml kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi:

- Bu kalem, bir enjeksiyonda 1 dozluk aşamalarda 30 ila 60 arasında doz aşamasına kadar doz sağlar.
- İleri doğru döndürdüğünüz her bir doz aşaması 1 birim insülin glarjin ve 0,33 mikrogram liksisenatid içerir.

Suliqua dozunuz doz aşamaları halinde verilir. Enjeksiyon kalemi üzerindeki doz alım aralığı enjekte edilecek olan Suliqua doz aşamalarının sayısını göstermektedir. 60 doz aşamasından daha büyük bir doz enjekte etmeyin.



Suliqua'yı enjekte etme zamanı

Suliqua'yı bir öğünden önceki bir saat içerisinde günde bir defa kullanın. Suliqua, tercihen en uygun öğünü seçtiğinizde her gün aynı öğünden önce enjekte edilmelidir. Suliqua'yı mide kısmına veya uyluğun dışına enjekte edin. Enjeksiyon bölgelerini değiştirmeyi unutmayın.


Suliqua'yı enjekte etmeden önce

- Bu hasta bilgilendirme broşürünün içerdiği talimatlara her zaman uyun.
- Tüm talimatlara uymazsanız çok fazla ya da çok az Suliqua alabilirsiniz.

Hata yapmamak için: doğru kalemi aldığımızdan emin olmak amacıyla, özellikle birden fazla enjeksiyon ilacı kullanıyorsanız her enjeksiyondan önce ilaç kutusunu ve enjeksiyon kalemi üzerindeki etiketi kontrol edin. Emin değilseniz bir doktora veya eczane personeline danışın.

Çok fazla Suliqua kullanmanız durumunda

Bu ilaçtan çok fazla enjekte ettiyseniz kan şekeri düzeyi düşebilir (hipoglisemi). Kan şekerinizi kontrol edin ve kan şekerinizin çok düşmesini engellemek için daha fazla gıda tüketin.



Suliqua'yı enjekte etme zamanı

Suliqua kullanmayı unutmanız durumunda

Bir doz Suliqua unuttuysanız veya yeterince insülin enjekte etmediyseniz kan şekeri düzeyi çok yükselebilir (hiperglisemi). Gerekirse, Suliqua sonraki öğünden önce enjekte edilebilir.

- Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz enjekte etmeyin.
- Günde iki enjeksiyon yapmayın.
- Kan şekerini kontrol edin ve ardından sonraki dozu her zamanki saatinde enjekte edin.



Suliqua'nın nasıl muhafaza edileceđi

Bu ilacı çocukların göremeyeceđi ve erişemeyeceđi bir yerde muhafaza edin.

“SON KUL” sonrasında ambalajda ve kalem üzerindeki etikette belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanın. Son kullanma tarihi, belirtilen ayın son günüdür.

İlk kullanımdan önce

Soğutucuda muhafaza edin (2°C–8°C).

Dondurulmamalıdır veya dondurucu bölmesi ya da dondurucu blođu ile doğrudan temas halinde muhafaza edilmemelidir.

İşğa karşı hassas olmasından dolayı enjeksiyon kalemini dış kutusuyla birlikte muhafaza edin.

İlk kullanımdan sonra/boş kalemler

Enjeksiyon kalemi, 25°C altında olmak koşuluyla buzdolabının dışında en fazla 28 gün muhafaza edilebilir. Bu zaman aralıđından sonra kalemi atın.

Buz dolabının arka kısmına doğru koyulmamalıdır ve dondurulmamalıdır. Enjeksiyon kalemini doğrudan ısıdan veya doğrudan güneş ışığından koruyarak muhafaza edin. Her enjeksiyondan sonra koruyucu başlık enjeksiyon kalemine takılmalıdır.

Enjeksiyon kalemini aşırı sıcak veya soğuk bir günde arabada bırakmayın. Enjeksiyon kalemini iğne takılıyken saklamayın.

İlaçlar, atık suyun içine veya evsel atıkların içine atılmamalıdır. Eczane personeline, artık kullanılmayan ilaçların nasıl atılacağını sorun. Bu önlemler çevreyi korumakya yöneliktir.

Diđer

Yan etkileri bildirme

Yan etki yařarsanız bir doktorla, eczane personeli ile veya hemřire ile konuřun. Ayrıca bu, bu bilgilerde bahsedilmeyen yan etkiler için de geerlidir.

Yan etkileri bildirerek, ilacın gvenliđi ile ilgili bilginin artmasına katkıda bulunabilirsiniz.



Enjeksiyon kalemi



Suliqua SoloSTAR®, dozun 1 birim aşamalarıyla ayarlandığı kullanıma hazır enjeksiyon kalemidir. En fazla doz, enjeksiyon başına 60 birimdir.



Suliqua® (insülin glarjin + liksisenatid) R, F, A10AE54, 100 birim/ml + 50 mikrogram/ml, enjeksiyon sıvısı, kullanıma hazır enjeksiyon kalemindeki çözelti ve 100 birim/ml + 33 mikrogram/ml enjeksiyon sıvısı, kullanıma hazır enjeksiyon kalemindeki çözelti. **Endikasyon:** Suliqua, sadece metforminle veya başka bir ağız yoluyla glikoz düşürücü ilaç ya da bazal insülinle kombinasyon halinde yeterli kontrol elde edilemediğinde, metforminle kombinasyon halinde, glisemik kontrolü artırmak için yetişkinlerin tip 2 diyabet tedavisi için tasarlanmıştır. **Uyarılar ve ikaz:** Suliqua, tip 1 diabetes mellituslu (şeker hastalığı) hastalarda veya diyabetik ketoasidoz tedavisinde kullanılmamalıdır. Daha fazla bilgi için, bkz, www.fass.se. **Ambalaj:** Suliqua SoloStar 3x3 ml kalemler ve 5x3 ml kalemler. Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. İlaçlarımız hakkında sorularınız olursa lütfen infoavd@sanofi.com adresinden irtibat kurun. Kısa Ürün Bilgilerinin son inceleme tarihi: Şubat 2017.

▼ Bu ilaç uzun süreli izlemeye tabidir. Daha fazla bilgi için, bkz, www.fass.se



Notlar

Diyabet ürünlerimiz
hakkındaki sorular:
020-52 68 87

www.insulin.se adresinde diyabet hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Ayrıca www.fass.se adresinden farklı insülinlere ilişkin bilgiler bulabilirsiniz

Hasta bilgilendirme broşürünü dikkatli bir şekilde okuyun!