

## Vad bör jag veta om Xarelto?

- ◆ Xarelto gör blodet tunnare, vilket förhindrar bildning av farliga blodproppar.
- ◆ Xarelto måste tas exakt så som din läkare ordinerat. För att få ett optimalt skydd mot blodproppar **ska du aldrig hoppa över en dos.**
- ◆ Du ska inte sluta ta Xarelto utan att först tala med din läkare, eftersom risken för blodproppar kan öka.
- ◆ Tala om för din vårdgivare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, innan du påbörjar behandling med Xarelto.
- ◆ Tala om för din vårdgivare att du tar Xarelto innan kirurgi eller andra ingrepp.

MA-M\_RIV-SE-0003-1  
April 2019

## När ska jag be om råd från min läkare?

När man tar blodförtunnande medel som Xarelto är det viktigt att känna till eventuella biverkningar. Blödningar är den vanligaste biverkningen. Påbörja inte behandling med Xarelto om du vet att du har risk för blödningar, utan att först diskutera detta med din läkare. Tala genast om för din läkare om du har fått några tecken eller symtom på blödning enligt nedan:

- ◆ smärta
- ◆ svullnad eller obehag
- ◆ huvudvärk, yrsel eller svaghet
- ◆ ovanligt många blåmärken, näsblödning, blödningar från tandköttet eller från sår som tar lång tid att sluta blöda

- ◆ menstruation eller vaginal blödning som är kraftigare än normalt
- ◆ blod i urinen som kan vara rosa- eller brunfärgad, röd eller svart avföring
- ◆ upphostningar med blod, eller kräkningar med blod eller kaffesumpsliknande kräkningar.

## Hur ska jag ta Xarelto?

- ◆ För att få ett optimalt skydd, ska Xarelto
  - 2,5 mg tas med eller utan mat
  - 10 mg tas med eller utan mat
  - 15 mg tas med mat
  - 20 mg tas med mat.

 **Xarelto**<sup>®</sup>  
rivaroxaban



# Patientkort

Xarelto 2,5 mg  
Xarelto 10 mg  
Xarelto 15 mg  
Xarelto 20 mg

Kryssa i förskrivna dos

- ◆ **Bär alltid detta kort med dig**
- ◆ **Ta fram kortet varje gång du söker behandling hos läkare eller tandläkare**

## Jag får antikoagulationsbehandling med Xarelto (rivaroxaban)

Namn

Andra läkemedel/medicinska tillstånd

Adress

Födelsedatum

Vikt

## I akuta situationer, vänligen kontakta:

Läkarens namn

Läkarens telefonnummer

Läkarens stämpel

## Vänligen kontakta också:

Namn

Telefonnummer

Relation

## Information för vårdgivare:

- ◆ INR-test ska inte användas eftersom det inte är ett tillförlitligt mått på den antikoagulatoriska aktiviteten hos Xarelto.