

PATIENTINFORMATION

TIL DIG SOM SKAL BEHANDLES MED IDELVION®

(albutrepenonakog alfa)



 **IDELVION®**
(albutrepenonacog alfa)
Coagulation Factor IX (Recombinant), Albumin Fusion Protein



IDELVION - TIL DIG SOM HAR HÆMOFILI B

Hæmofili B er en blødersygdom, som medfører, at man mangler eller har for lidt koagulationsfaktor IX. Der findes flere forskellige lægemidler, som virker ved at faktor IX tilføres blodet og øger koagulationsevnen. IDELVION er et af disse lægemidler.

I denne brochure findes information til dig, som er i behandling med IDELVION. Du vil få viden om, hvordan IDELVION virker, hvorfor det er langtidsvirkende, og hvad du skal være opmærksom på, når du er i behandling. Efter at have fået instruktioner vil de fleste kunne lære selv at tage IDELVION eller vil kunne få hjælp til injektionen af en pårørende. Læs endelig hele indlægssedlen igennem inden du begynder at anvende dette lægemiddel. Har du spørgsmål om IDELVION, skal du tale med din læge eller sygeplejerske.




Dette er IDELVION

IDELVION er et lægemiddel, som man anvender for at forebygge og behandle blødninger ved hæmofili B. IDELVION fremstilles med rekombinant* DNA-teknik og indeholder koagulationsfaktor IX, som kan mangle helt eller delvis, eller som ikke fungerer, som den skal, ved hæmofili B.

IDELVION er langtidsvirkende

IDELVION er blevet udviklet ved hjælp af ny teknik for at kunne gøre det langtidsvirkende. I IDELVION er faktor IX koblet sammen med albumin, et protein som findes naturligt i kroppen. Albuminet gør, at IDELVION bliver langtidsvirkende; det vil sige, at det nedbrydes langsommere og findes i blodet gennem længere tid. IDELVION er inaktivt, indtil der bliver brug for det til koagulation. Når man kommer til skade eller begynder at bløde, aktiveres faktor IX og blodet koagulerer; samtidig spaltes albuminet fra uden at påvirke blodets koagulation.



Når du er i behandling med IDELVION vil du være beskyttet mod blødninger. Det er vigtigt, at du altid følger din læges anvisninger og tager behandlingen, når lægen siger du skal.


*Rekombinant teknik indebærer, at DNA (en del af et arveanlæg) benyttes til at fremstille faktor IX ad kunstig vej.





Om behandling med IDELVION

Behandling med IDELVION er altid individuelt tilpasset, og din læge bestemmer, hvilken dosis og hvor ofte du skal tage IDELVION. For at bestemme den dosis og det interval, som passer præcist til dig, tager din læge hensyn til dit aktivitetsniveau, livsstil, vægt, alder, sværhedsgraden af din sygdom og blodprøvesvar. Din læge og sygeplejerske vil hjælpe dig med at planlægge, hvornår du skal tage IDELVION for at det vil påvirke din hverdag så lidt som muligt og passe ind i dine aktiviteter.



Det er vigtigt, at du tager IDELVION, når du skal, fordi faktor IX-niveauet i blodet vil falde over tid.

Behandlingsdagbog

Bagest i denne brochure er der en Behandlingsdagbog. I den kan din læge og sygeplejerske skrive dosis og doseringsinterval. Hver gang du tager IDELVION, anbefaler vi, at du her skriver dato, antal enheder (IE) og klistrer etiketten/etiketterne ind fra glassene. Hvis du får en blødning, vil det være en god idé at notere hvornår, hvad og hvilke foranstaltninger, som var nødvendige, for at stoppe den.

Eventuelle bivirkninger

IDELVION kan ligesom alle andre lægemidler forårsage bivirkninger, men ikke alle de, som behandles med IDELVION, behøver at få dem. De almindeligste bivirkninger med IDELVION er reaktion ved injektionsstedet og hovedpine.

Kontakt din læge med det samme:

- hvis du får symptomer på allergisk reaktion (se herunder)
- hvis du føler, at lægemidlet ikke fungerer ordentligt (se herunder)

Allergiske overfølsomhedsreaktioner kan forekomme

IDELVION indeholder spor af hamsterproteiner. Tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner er nældefeber, hududslet, trykken for brystet, hvæsende åndedræt, lavt blodtryk og anafylaksi (en alvorlig allergisk reaktion som forårsager svære åndedrætsvanskeligheder eller svimmelhed). Hvis du oplever nogle af disse reaktioner, skal du stoppe med at anvende IDELVION med det samme og kontakte din læge eller hæmofilicentret.

Inhibitorer (dannelse af antistoffer)

Du kan udvikle inhibitorer (neutraliserende antistoffer), hvilket medfører, at behandlingen med faktor IX ikke længere fungerer optimalt. Kontakt omgående din læge eller sygehus hvis du får en blødning, som ikke kan kontrolleres med IDELVION.



Hvordan skal IDELVION opbevares?

IDELVION opbevares ved højst 25 °C og må ikke fryses ned. Opbevar hætteglasset med pulver i pakningen, da IDELVION er lysfølsomt. Opbevar IDELVION udenfor børns syns- og rækkevidde. Anvend IDELVION før den udløbsdato, som står på etiketten og pakningen.

Findes der en instruktionsfilm om, hvordan man tager IDELVION?

Ja. På www.medicininstruktion.dk er en instruktionsfilm, som viser hvordan du forbereder og tager IDELVION.

På hvilken tid af døgnet skal jeg tage IDELVION?

Du kan tage IDELVION på den tid af døgnet, som passer dig bedst. Det spiller ingen rolle, om du tager IDELVION om morgenen eller om aftenen, hvis ikke din læge har givet dig anden besked.

Hvad skal jeg gøre, hvis en større blødning ikke vil stoppe?

Kontakt din læge eller hæmofilicenter med det samme.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har taget for stor mængde IDELVION?

Kontakt din læge eller hæmofilicenter med det samme.

Kan jeg køre bil, når jag tager IDELVION?

Ja. IDELVION påvirker ikke evnen til at køre bil eller anvende maskiner.

▼ **Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får.**

Hvis du får bivirkninger, så tal med læge, apotekspersonale eller sygeplejerske. Dette gælder også bivirkninger, som ikke nævnes i denne information. Du kan også rapportere bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen: www.meldenbivirkning.dk eller på www.laegemiddelstyrelsen.dk. Ved at rapportere bivirkninger kan du bidrage til at øge sikkerhedsinformationerne om lægemidler.

