

# BRUGER- VEJLEDNING IDELVION® (albutrepenonakog alfa)

## Opbevaring:

IDELVION skal opbevares ved højst 25°C og må ikke fryses ned. Hætteglasset med pulver skal opbevares i pakningen, fordi IDELVION er lysfølsomt.



## Tilberedning:

Læs hele indlægssedlen omhyggeligt igennem, inden du starter med at bruge dette lægemiddel. Du skal ikke selv injicere lægemidlet, før du har fået instruktioner af din læge eller sygeplejerske. Du kan også finde instruktion på [www.medicininstruktion.dk](http://www.medicininstruktion.dk).

**Vask hænderne grundigt**, inden du går i gang.

**Opvarm hætteglasset med væske** i hånden til stue- eller kropstemperatur. Farven på pulveret kan variere fra svagt gul til hvid. Også på den færdige IDELVION-opløsning kan farven variere – fra farveløs til let gulfarvet.

**Fjern forsigtigt plastlågene** fra begge hætteglassene og aftør gummipropperne med en desinfektionsserviet. Lad hætteglassene tørre, inden Mix2Vial™ åbnes. Følg derefter anvisningerne på næste side.

## Instruktioner for anvendelse af Mix2Vial™

1. Åbn Mix2Vial-emballagen ved at trække plomberingen af. Tag **ikke** Mix2Vial ud af emballagen.



2. Placer hætteglasset med væske (solvens) på en **plan overflade** og bliv ved med at holde fast i glasset. Tag beskyttelsespakningen med Mix2Vial-sættet og tryk spidsen af den **blå del direkte ned** gennem hætteglassets prop.



3. Fjern forsigtigt beskyttelsespakningen fra Mix2-Vial-sættet ved at tage fat om kanten oppefra og trække den **lige op**. Sørg for at kun pakningen fjernes og ikke Mix2Vial-sættet.



4. Stil hætteglasset med pulver på en plan, fast overflade og bliv ved med at holde fast i glasset. Vend hætteglasset med væske og det fastgjorte sæt og tryk spidsen af den gennemsigtige adapterdel **lige ned** gennem hætteglasset med pulver. Væsken vil automatisk løbe over i hætteglasset med pulver.



5. Tag fat i den gennemsigtige del af Mix2Vial-sættet med den ene hånd og i den blå del med den anden hånd. Skru sættet fra hinanden til to dele ved at dreje mod uret. Kassér hætteglasset med væske med den blå del fastsat.



6. Rotér hætteglasset med pulver forsigtigt, indtil pulveret er fuldstændig opløst. **Ryst ikke hætteglasset.**



7. Træk luft ind i en tom steril sprøjte. Sprøjten kobles sammen med Mix2Vial-sættet (mens hætteglasset med pulver stadig står lodret) ved at dreje med uret. Sprøjt luft ind i flasken.



8. Med stemplet i bund vendes hætteglasset (sat sammen med sæt og sprøjte) op og ned. Træk opløsningen ind i sprøjten ved at føre stemplet langsomt tilbage.






9. Når hele opløsningen er blevet overført til sprøjten, så tag godt fat i sprøjten, uden at vende den, og afmontér Mix2Vial-sættet fra sprøjten ved at dreje det mod uret.



**Kontrollér opløsningen** ved at holde den op mod lyset inden du anvender den, og anvend den ikke hvis den er uklar eller indeholder flager eller partikler.

## Instruktioner for injektion

1. Læg sprøjten med IDELVION fra dig uden at spidsen rører ved noget, så den fortsat er steril. Placer et stasebånd rundt om overarmen. Knyt hånden for at gøre det lettere at finde venen. Desinficér indstikstedet med en desinfektionsserviet.
2. Tag butterflynålen ud af pakningen og let lidt på slangens korkprop, så bliver det lettere at skrue den af senere. Fjern nålebeskyttelsen. Hold begge butterflynålens vinger mellem tommel og pegefinger med nålens skrå åbning rettet opad. Før nålen ind i venen i en så flad vinkel som muligt.
3. Hvis nålen sidder korrekt i venen, bliver slangens øverste del automatisk fyldt med blod. Det er en god idé at fastgøre slangen med et plaster. Løsn stasebåndet. Fjern korkproppen (slangens lukning).
4. Når slangen er helt fyldt med blod, skal du stoppe blodudløbet ved at slå et knæk på slangen i den ydre ende. Sørg for at der ikke kommer blod ind i sprøjten med lægemidlet, fordi der så kan opstå en risiko for, at blodet koagulerer i sprøjten, hvilket kan medføre at et fibrinkoagel havner i kroppen.
5. Injicér opløsningen langsomt ind i venen. Hvis du skal injicere indholdet fra mere end én flaske, tilslutter du næste forberedte sprøjte med IDELVION til samme butterflynålesæt og fortsætter injektionen. Føl efter om du får nogle umiddelbare bivirkninger. Hvis du får nogle bivirkninger, som kan skyldes administreringen af IDELVION, skal injektionen afbrydes.
6. Når hele opløsningen er injiceret, fjerner du forsigtigt butterflynålen uden at trykke på indstikstedet. Lås butterflynålens sikkerhedsmekanisme ved at trykke hagerne på siden ind og trække nålen tilbage. Først når butterflynålen er fjernet, trykker du med et fast tryk et tørt kompress mod indstikstedet for at stoppe blødningen. Sæt plaster på, hvis det er nødvendigt. Notér injektionen i din Behandlingsdagbog.





▼ **Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning.  
Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden.  
Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får.**

Hvis du får bivirkninger, så tal med læge, apotekspersonale eller sygeplejerske. Dette gælder også bivirkninger, som ikke nævnes i denne information. Du kan også rapportere bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk) eller på [www.laegemiddelstyrelsen.dk](http://www.laegemiddelstyrelsen.dk). Ved at rapportere bivirkninger kan du bidrage til at øge sikkerhedsinformationerne om lægemidler.

**Mix2Vial**<sup>™</sup> er et registreret varemærke tilhørende West Pharmaceutical Services, Inc. eller et af deres datterselskaber.