

KLEXANE® (enoxaparin), Receptbelagt läkemedel

Terapeutiska indikationer:

KLEXANE® är avsett för vuxna patienter för:

Profylax till kirurgipatienter med måttlig eller hög risk för venös tromboembolism, särskilt till patienter som genomgår ortopedisk, allmän eller cancerkirurgi.

Profylax till patienter med ökad risk för venös tromboembolism och som är tillfälligt immobiliserade pga akut sjukdomstillstånd som t.ex. akut hjärtsvikt, andningsinsufficiens, allvarlig infektion eller reumatologiska sjukdomar.

Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) i de fall trombolytisk behandling eller kirurgi av lungemboli inte är aktuell.

Trombosprofylax vid extrakorporeal cirkulation under hemodialys.

Akut kranskärlssjukdom: Behandling av instabil angina och icke-Q-vågs-myokardinfarkt (NSTEMI) i kombination med oralt acetylsalicylsyra.

Behandling av akut hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI), inkluderat patienter som behandlas medicinskt eller med koronarangioplastik (PCI).

Varningar och försiktigheter: KLEXANE® är kontraindicerat vid allvarlig aktiv blödning eller tillstånd med hög risk för okontrollerad blödning. För ytterligare information se www.fass.se

Styrkor och förpackningar: Förfyllda sprutor med automatiskt nålskydd: 2000 IE (20 mg)/0,2 ml: 10x0,2 ml, 50x0,2 ml. 4000 IE (40 mg)/0,4 ml: 10x0,4 ml, 50x0,4 ml. 6000 IE (60 mg)/0,6 ml: 10x0,6 ml. 8000 IE (80 mg)/0,8 ml: 10x0,8 ml. 10000 IE (100 mg)/1 ml: 10x1 ml. 12000 IE (120 mg)/0,8 ml: 10x0,8 ml. 15000 IE (150 mg)/1 ml: 10x1 ml. Injektionsflaskor: 30000 IE (300 mg)/3 ml, 100000 IE (1000 mg)/10 ml.

Kontaktuppgifter: KLEXANE® tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumé: juni 2020.

Läs bipacksedeln noggrant.

MAT-SE-2001009 (v2.0) maj 2021



Sanofi AB · Box 30052 · 104 25 Stockholm · www.sanofi.se
tel 08-634 50 00 · fax 08-634 50 01

Klexane®
enoxaparin




Så här använder
du KLEXANE®
förfyllda sprutor med
automatiskt nålskydd



PATIENTINFORMATION

Så här använder du KLEXANE® förfyllda sprutor med automatiskt nålskydd



1) Tag försiktigt av nålskyddet från sprutan.

Tryck inte på kolven innan injektion för att få bort luftbubblor. Detta kan leda till förlust av läkemedel. När du har tagit bort nålskyddet, se till att nålen inte rör någonting, detta för att se till att nålen förblir ren (steril).

När mängden läkemedel i sprutan motsvarar din förskrivna dos, är det ingen idé att justera dosen. Du är nu redo att injicera.

När dosen beror på din kroppsvikt, kan du behöva justera dosen i sprutan för att motsvara den förskrivna dosen. I sådant fall, kan du bli av med extra läkemedel genom att hålla sprutan nedåt (för att behålla luftbubblan i sprutan) and trycka ut extra mängd i behållaren.

Välj ett område på höger eller vänster sida av magen. Detta ska vara minst 5 cm från naveln och ut mot sidorna. Injicera dig inte runt befintliga ärr eller blåmärken.

Byt injektionsstället mellan vänster och höger sida av magen, beroende på området för senaste injektionen. Tvätta händerna. Rengör området (gnid inte) där du vill injicera med en kompress eller tvål och vatten.

Sitt eller ligg i en bekväm ställning så du är avslappnad. Se till att du ser injektionsstället. En fätölj, vilstol eller säng med kuddar är bäst.



2) Injicera hela sprutans innehåll genom att trycka ned kolven så långt det går.

Håll sprutan i den hand du skriver med (som en penna). Med din andra hand, kläm försiktigt ihop det rengjorda området på magen mellan pekfingeret och tummen för att bilda ett hudveck. Håll kvar hudvecket under hela injektionen.

Håll sprutan så att nålen pekar rakt ner (vertikalt i 90°vinkel). Stick ner hela nålen i hudvecket.

Pressa ner kolven med tummen, detta medför att läkemedlet kommer till magfettet i magen. Genomför injektionen genom att använda allt läkemedel i sprutan.

Klexane[®]
enoxaparin



3) Avlägsna nålen från injektionsstället genom att dra den rakt ut.

Kasta den använda sprutan i en nålbehållare. Stäng locket till behållaren ordentligt och placera behållaren utom räckhåll för barn. När behållaren är full, kassera den enligt instruktioner från läkare eller apotekspersonal.

Oanvänt läkemedel eller skräp ska slänga i enlighet med lokala riktlinjer.

Kassera den enligt instruktioner från läkare eller apotekspersonal

OBS! Säkerhetssystemet som utlöser skyddshöljet kan endast aktiveras om sprutan har tömts, genom att kolvstången har tryckts ned hela vägen.

För att undvika blåmärken gnid inte på huden efter injektionen.