

480 ±0.5

40










40

Pantone 361 C

Pantone 7496 C

Pantone 186 C

Black

Pasientkort  Remsima[®] infliximab Vis dette kortet til enhver lege som er involvert i din behandling.	Pasientnavn: Legens navn: Legens telefonnummer: Dato for oppstart av Remsima-behandling: Nåværende administrering:  LM165907-PA004	Lag deg også en liste over alle andre legemidler som du bruker og ta denne med til ethvert besøk hos lege. Liste over andre legemidler: Liste over allergier:  LM165907-PA004	Be legen din notere type og dato for den/de siste undersøkelsen(e) for tuberkulose (TB) under: Test: Dato: Resultat: Det er viktig at du og legen din noterer ned handelsnavnet og batchnummeret til legemidlet som blir gitt til deg. Handelsnavn: Batchnummer:	Patient informationskort  Remsima[®] Infliximab Vis dette kortet til enhver læge, der er involvert i din behandling.	Patientens navn: Lægens navn: Lægens telefonnummer: Dato for start på Remsima-behandling: Nåværende doseringer:  LM165907-PA004	Du skal sikre dig, at du ved hvert lægebesøg også medbringer en liste over alle andre lægemidler, som du bruger. Liste over anden medicin: Liste over allergier:  LM165907-PA004	Du skal bede din læge om at notere type og dato for seneste screening(er) for tuberkulose (TB) nedenfor: Test : Dato: Resultat: Det er vigtigt, at du og din læge noterer produktnavn og batchnummer på din medicin. Præparatnavn: Batchnummer:	Åminningarkort sjúklings  Remsima[®] Infliximab Kortið skal sýna öllum þeim læknum sem koma að meðferðinni.	Nafn sjúklings: Nafn læknis: Símanúmer læknis: Dagsetning þegar Remsima meðferð hófst: Núverandi lyfjagjöf:  LM165907-PA004	Þú skalt einnig hafa lista meðferðis yfir öll önnur lyf sem þú notar í hvert skipti sem þú leitar til heilbrigðisstarfsfólks. Listi yfir ofnæmi: Listi yfir önnur lyf:  LM165907-PA004	Pharma code area Þú skalt biðja lækinn um að skrá niður tegund og dagsetningu síðustu berklarannsóknar hér fyrir neðan: Próf: Dagsetning: Niðurstaða: Það er mikilvægt að þú og lækinn þinn skrái sérheiti og lotunúmer lyfsins sem þér er gefið. Sérlyfjaheiti: Lotunúmer:
--	--	--	--	--	---	--	---	---	---	--	--

135 ±0.5

480 ±0.5

40

40

Pantone 7496 C

Black

<p>Þetta áminningarkort inniheldur mikilvægar öryggisupplýsingar sem þú þarft að hafa í huga áður en þú færð lyfið Remsima og meðan á meðferð stendur.</p> <p>Þegar þú byrjar á nýju korti skaltu geyma þetta kort til hliðsjónar í 4 mánuði eftir síðasta skammtinn af Remsima.</p> <p>Þú skalt lesa fylgiseðil Remsima vandlega áður en þú byrjar að nota lyfið.</p> <p>Hafðu kortið meðferðis í 4 mánuði eftir að þú fékkst síðast Remsima skammt, eða við þungun í 12 mánuði eftir fæðingu barnsins. Aukaverkanir geta komið fram löngu eftir að þú færð síðasta skammtinn af Remsima.</p>	<p> Sýkingar Áður en meðferð með Remsima hefst</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segðu læknum frá því ef þú ert með sýkingu, jafnvel þótt hún sé aðeins smávægileg. • Það er mjög mikilvægt að þú segir læknum frá því ef þú hefur einhvern tímunn fengið berkla eða ef þú hefur verið í náinni snertingu við einhvern sem hefur haft berkla. Læknirinn mun rannsaka hvort þú hafir berkla. Þú skalt biðja lækninn um að skrá tegund og dagsetningu síðustu berklarannsóknar á kortið. 	<ul style="list-style-type: none"> • Segðu læknum frá því ef þú ert með lifrabólgu B eða ef þú veist eða þig grunar að þú getir borið lifrabólgu B veiruna í þér. <p>Meðan á meðferð með Remsima stendur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segðu læknum samstundis frá því ef þú hefur einkenni sýkingar. Einkennin geta verið hiti, þreyta, (þrálátur) hósti, mæði, þyngdartap, nætursviti, niðurgangur, sár, tannkvillar, sviðatilfinning við þvaglát eða flensulík einkenni. 	<p> Meðganga, brjóstgjöf og bólusetningar </p> <ul style="list-style-type: none"> • Ef þú fékkst Remsima á meðgöngu eða hefur barn á brjósti er mikilvægt að þú upplýsir lækni barnsins um það áður en barnið fær einhverjar bólusetningar. Barnið á ekki að fá bólusetningu með lifandi bóluefnum svo sem BCG (notað til að koma í veg fyrir berkla) í 12 mánuði frá fæðingu eða á meðan þú hefur barnið á brjósti, nema læknir barnsins ráðleggi annað. 	<p>Dette patient informationskort indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du skal være opmærksom på før og under behandling med Remsima.</p> <p>Behold dette kort som reference i 4 måneder efter din sidste Remsima-dosis, når du starter på et nyt kort.</p> <p>Læs indlægssedlen for Remsima grundigt, inden du begynder at tage medicinen.</p> <p>Opbevar dette kort på dig i 4 måneder efter du har fået din sidste dosis Remsima, eller i tilfælde af graviditet i 12 måneder, efter du har født. Bivirkninger kan forekomme lang tid efter sidste dosis.</p>	<p> Infektioner Før behandling med Remsima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortæl din læge, hvis du har en infektion, også selvom det er en meget let infektion • Det er meget vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du nogensinde har haft tuberkulose (TB), eller hvis du har været i tæt kontakt med en person, som har haft TB. Din læge vil teste dig for at se, om du har haft TB. Du skal bede din læge om at notere type og dato for din(e) seneste screening(er) for TB på kortet 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortæl din læge, hvis du har hepatitis B, eller hvis du ved eller har mistanke om, at du er bærer af hepatitis B virus. <p>Under behandling med Remsima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortæl straks din læge, hvis du har tegn på en infektion. Tegn inkluderer feber, træthed, (vedvarende) hoste, åndenød, væggtab, natlig svedtendens, diarré, sår, tandproblemer, en brændende smerte, når du lader vandet, eller influenzalignende symptomer. 	<p> Graviditet, amning og vaccinationer </p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har fået Remsima, mens du var gravid, eller hvis du ammer, er det vigtigt, at du informerer dit barns læge om det, før dit barn bliver vaccineret. Dit barn må ikke få en "levende vaccine", fx BCG (bruges til at forebygge tuberkulose) inden for 12 måneder efter fødslen, eller mens du ammer, medmindre barnets læge anbefaler noget andet. 	<p>Dette pasientkortet indeholder vigtig sikkerhedsinformation som du må være opmærksom på før og under behandling med Remsima.</p> <p>Når et nytt kort tas i bruk, behold dette kortet som referanse i 4 måneder etter din siste dose med Remsima.</p> <p>Vennligst les pakningsvedlegget til Remsima nøye før du starter å bruke dette legemidlet.</p> <p>Ha dette kortet med deg i 4 måneder etter din siste dose med Remsima eller ved graviditet, i minst 12 måneder etter fødselen av barnet ditt. Bivirkninger kan oppstå i lang tid etter din siste dose.</p>	<p> Infeksjoner Før Remsimabehandling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informer legen din dersom du har en infeksjon selv om den er mindre alvorlig • Det er veldig viktig at du informerer legen din dersom du noen gang har hatt tuberkulose (TB), eller hvis du har vært i nær kontakt med noen som har hatt TB. Legen din vil teste deg for å se om du har TB. Be legen din notere type og dato for din(e) siste undersøkelse(r) for TB på kortet • Informer legen din dersom du har hepatitt B eller hvis du vet eller mistenker at du er bærer av hepatitt B-viruset. 	<p>Under Remsimabehandling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informer legen din umiddelbart dersom du har tegn på en infeksjon. Tegnene inkluderer feber, tretthetsfølelse, (vedvarende) hoste, kortpustethet, vekttap, nattesvette, diaré, sår, tannproblemer, svie ved vannlating eller influenzalignende symptomer. 	<p> Graviditet, amning og vaksiner </p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du fikk Remsima da du var gravid eller hvis du ammer er det viktig at du informerer legen til barnet ditt om dette før barnet ditt får noen vaksiner. Barnet ditt bør ikke få en «levende vaksine», slik som BCG (brukes til å forebygge tuberkulose) før 12 måneder etter fødselen eller så lenge du ammer, med mindre ditt barns lege anbefaler noe annet.
---	--	---	---	---	--	---	--	--	---	---	--

135 ±0.5