

Potilaskortti

FI SV

Remsima[®]
Infliximabi

Näytä tämä kortti
kaikille hoitoosi
osallistuville
lääkäreille.

Potilaan nimi:

.....
.....

Lääkärin nimi:

.....
.....

Lääkärin puh.nro:

.....
.....

Remsima-hoito aloitettu:

.....
.....

Annetut infuusiot:

.....
.....

Varmista, että sinulla on mukana luettelo kaikista muista käyttämäsi lääkkeistä, kun menet vastaanotolle.

Luettelo muista käytössä olevista lääkkeistä:

.....
.....
.....

Allergiat:

.....
.....
.....

 HEALTHCARE
 CELLTRION™

LM143707-PA003

Pyydä lääkäriä merkitsemään tähän tiedot viimeisimmästä tuberkuloosiseulonnasta:

Menetelmä:

.....
.....

Päiväys:

.....
.....

Tulos:

.....
.....

On tärkeää, että sinä ja lääkäri merkitsette muistiin lääkkeesi kaupanimen ja eränumeron.

Kauppanimi:

.....
.....

Eränumero:

.....
.....

Patientkort

FI SV

Remsima[®]
Infliximab

Visa detta kort
vid varje tillfälle
som du besöker
läkare.

Namn, patient:

.....
.....

Namn, läkare:

.....
.....

Telefonnummer, läkare:

.....
.....

Datum för påbörjad
behandling med Remsima:

.....
.....

Senaste behandlingar:

.....
.....

Se till att du alltid tar med en lista över alla andra läkemedel som du använder vid varje besök till hälso- och sjukvårdspersonal.

Lista över andra läkemedel:

.....
.....

Lista över allergier:

.....
.....

 HEALTHCARE
 CELLTRION™

LM143707-PA003

Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning:

Undersökning:

.....
.....

Datum:

.....
.....

Resultat:

.....
.....

Det är viktigt att du och din läkare skriver ned produktnamnet och tillverkningsattsnumret på ditt läkemedel.

Produktnamn:

.....
.....

Tillverkningsattsnummer:

.....
.....

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan och under behandlingen med Remsima.

När du börjar på ett nytt kort ska du spara det här kortet som referens i 4 månader efter din sista dos av Remsima.

Läs noga Remsima bipacksedeln i förpackningen innan du börjar använda detta läkemedel.

Ha alltid med dig detta kort i 4 månader efter din sista Remsima-dos, eller i händelse av graviditet i 12 månader efter ditt barns födelse. Biverkningar kan uppträda långt efter sista dosen.

| Infektioner |

Före behandling med Remsima

- Tala om för din läkare om du har en infektion, även en lindrig sådan.
- Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du någonsin har haft tuberkulos (TBC) eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Din läkare kommer att undersöka om du har tuberkulos. Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning på kortet.
- Tala om för din läkare om du har hepatit B eller om du vet eller misstänker att du är bärare av hepatit B virus.

Under behandling med Remsima

- Tala omedelbart om för din läkare om du har tecken på en infektion. Sådana tecken omfattar feber, trötthetskänsla, (ihållande) hosta, andfåddhet, viktnedgång, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär, sveda vid urinerings eller influensaliknande symtom.

| Graviditet, amning och vaccinationer |

- Om du har fått Remsima under din graviditet eller om du ammar, är det viktigt att du informerar ditt barns läkare om detta innan ditt barn får något vaccin. Ditt barn ska inte få "levande vacciner", såsom BCG (används för att förhindra tuberkulos) inom 12 månader efter födseln eller medan du ammar, om inte ditt barns läkare rekommenderar något annat.

Tämä potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa, josta sinun on hyvä olla tietoinen ennen Remsima-hoidon aloitusta ja sen aikana.

Kun aloitat uuden kortin, säilytäthän tämän kortin myöhempää tarvetta varten 4 kuukauden ajan viimeisen Remsima-annoksesi jälkeen.

Lue Remsima-valmisteen pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Pidä tämä kortti mukanas 4 kuukauden ajan viimeisimmän Remsima-annoksen jälkeen, tai jos olet raskaana, 12 kuukauden ajan synnytyksen jälkeen. Haittavaikutuksia voi ilmaantua pitkänkin ajan kuluttua viimeisestä annoksesta.

| Infektiot |

Ennen Remsima-hoitoa

- Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin infektio, vaikka se olisi hyvin vähäinenkin.
- On erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille, jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos olet joskus ollut läheisessä kontaktissa henkilön kanssa, jolla on ollut tuberkuloosi. Sinulle tehdään tuberkuloosin seulontakokeet. Pyydä, että lääkäri merkitsee tiedot seulontakokeista tähän korttiin.
- Kerro lääkärille, jos sinulla on B-hepatiitti tai jos tiedät tai epäilet olevasi B-hepatiittiviruksen kantaja.

Remsima-hoidon aikana

- Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu infektio-oireita, kuten kuumetta, väsymystä, (itsepintaista) yskää, hengenhdistusta, painon alenemista, yöhikoilua, ripulia, haavaumia, hammasongelmia, kirvelyä virtsatessa tai flunssan kaltaisia oireita.

| Raskaus, imetys ja rokotukset |

- Jos olet saanut Remsima-valmistetta raskauden aikana tai jos imetät, on tärkeää että kerrot siitä lastasi hoitavalle lääkärille, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotuksia. Lapsellesi ei saa antaa "elävää rokotetta", kuten BCG-rokotetta (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn) 12 kuukauteen syntymän jälkeen tai imetyksen aikana, ellei lastasi hoitava lääkäri toisin suosittele.