

Vad är Ganirelix Gedeon Richter och vad används det för?

Ganirelix Gedeon Richter används för att förebygga för tidig LH stegring som kan orsaka en för tidig ägglossning hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning.

Ganirelix Gedeon Richter förfyllda spruta med fast nål ska injiceras i fettlagret direkt under huden, enligt ordination från din läkare eller sköterska. Blanda inte Ganirelix Gedeon Richter med andra läkemedel.

Tag din injektion vid samma tid som du tar ditt äggblåse-stimulerande hormon.




Så här använder du Ganirelix Gedeon Richter

Ta alltid Ganirelix Gedeon Richter enligt anvisning från din läkare eller sköterska.

Förbered injektionen

1

Läs igenom bipacksedeln noga. Tvätta händerna och tag ut en förfylld spruta ur förpackningen. Håll i sprutan på mitten. Kontrollera att lösningen i sprutan är klar och fri från partiklar. Små luftbubblor kan vara synliga men dessa behöver ej avlägsnas. Håll sprutan horisontellt med nålen pekande bort från dig och drag av nålskyddet. Obs *vrid inte* av nålskyddet!



Injicera dosen

2

Tag ett tag om huden och för in nålen i hudveckat. Tryck försiktigt och stadigt ner kolven hela vägen tills sprutan är tom. Vänta 5 sekunder och släpp sedan hudveckat och dra ut nålen.



Sätt inte på nålskyddet för att undvika stickskador. Kasta använd spruta direkt i en sticksäker behållare (fråga efter en kanylburk på apoteket) och återlämna till apoteket för korrekt avfallshantering. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.



Hur förvaras Ganirelix Gedeon Richter?

Får ej frysas.

Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Om du har glömt att använda Ganirelix Gedeon Richter

Om du har glömt en dos, ta den så snart som möjligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Kontakta din läkare eller sköterska om du är osäker.

Läs noga igenom bipacksedeln
innan du börjar ta
Ganirelix Gedeon Richter

Viktig produktinformation. För fullständig information se bipacksedel.

Ganirelix Gedeon Richter (ganirelix), 0,25 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Ganirelix Gedeon Richter används för att förebygga för tidiga stegringar av luteiniseringshormon som kan orsaka för tidig ägglossning hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning. **Varningar och försiktighet:** Använd inte Ganirelix Gedeon Richter om du är allergisk mot ganirelix eller något annat ämne i detta läkemedel. Om du har ett aktivt allergiskt tillstånd eller får en allergisk reaktion av läkemedlet ska du sluta använda Ganirelix Gedeon Richter och sök omedelbart sjukvård. Du ska undvika använda läkemedlet om du är överkänslig mot GnRH eller GnRH-analoger, eller vid måttligt eller kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion. Är du gravid eller ammar ska du inte använda Ganirelix Gedeon Richter. Den vanligaste biverkningen är lokala hudreaktioner vid injektionsstället. Mindre vanliga biverkningar är huvudvärk, illamående och allmän sjukdomskänsla. **Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar ta Ganirelix Gedeon Richter. Den innehåller information som är viktig för dig. Fråga läkare eller sjuksköterska om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.** För mer information, se bipacksedel och www.fass.se.
Kontakt: Gedeon Richter Nordics AB, Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm.
Tel: 08- 611 24 00. **Medicinsk information:** medinfo.se@gedeonrichter.eu,
Tel: 08-611 24 22. Förkortad information baserad på bipacksedel daterad 2022-07-15.



GEDEON RICHTER

Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm, Sweden.

