

Hvad er Ganirelix Gedeon Richter, og hvad bruges det til?

Ganirelix Gedeon Richter bruges til at forhindre for tidlig LH-stigning, der kan forårsage for tidlig ægløsning hos kvinder, der gennemgår assisteret reproduktion.

Ganirelix Gedeon Richter fyldt injektionsprøjte med fast kanyle skal injiceres i fedtlaget direkte under huden, som ordineret af din læge eller sygeplejerske. Bland ikke Ganirelix Gedeon Richter med anden medicin.

Tag din injektion på samme tid, som du tager dit follikelstimulerende hormon.




Sådan anvender du Ganirelix Gedeon Richter

Tag altid Ganirelix Gedeon Richter i overensstemmelse med instruktion fra din læge eller sygeplejerske.

Forbered injektionen

1

Læs indlægssedlen omhyggeligt. Vask dine hænder og tag en fyldt sprøjte ud af pakken. Hold sprøjten på midten. Kontroller, at opløsningen i sprøjten er klar og fri for partikler. Små luftbobler kan være synlige, men disse skal ikke fjernes. Hold sprøjten vandret med kanylen pegende væk fra dig, og træk kanylehætten af. Bemærk: *Vrid ikke nålebeskytteren af!*



Injicer dosis

2

Injicér opløsningen i underhudsfedtet (som regel den nederste del af maven) i overensstemmelse med instruktion fra din læge eller sygeplejerske.

Tag fat i huden og indfør nålen.

Injicér opløsninge, indtil sprøjten er tom.

Giv slip på huden og vent 5 sekunder, før du trækker nålen ud.



Efter injektionen: For at undgå stikskader skal du ikke sætte hætten på kanylen igen. Bortskaf straks sprøjten på sikker vis i den punkturfaste beholder/kanyleboks, som afleveres på apoteket med henblik på korrekt bortskaffelse. Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.



Hvordan opbevarer man Ganirelix Gedeon Richter?

Må ikke fryses.

Opbevares ved stuetemperatur i den originale emballage.

Lysfølsom.

Hvis du glemmer at bruge Ganirelix Gedeon Richter

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den så hurtigt som muligt.

Tag ikke en dobbeltdosis for at kompensere for en glemt dosis.

Kontakt din læge eller sygeplejerske, hvis du er usikker.

Læs indlægssedlen omhyggeligt
før du begynder at tage
Ganirelix Gedeon Richter

GAN-40CT-SEC-20673-1



GEDEON RICHTER

Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm, Sweden.

