LECIGON®

(levodopa 20 mg/ml, carbidopa 5 mg/ml, entacapon 20 mg/ml)

Patient information

Information til dig, som skal starte på LECIGON®

Du har fået udleveret denne pjece af din læge eller sygeplejerske.

nordic INFUcare

www.infucare.com

Hvorfor har din læge ordineret LECIGON®?

LECIGON® er et lægemiddel, som din læge har valgt, fordi din nuværende behandling ikke giver tilstrækkelig virkning i forhold til at kontrollere dine Parkinson-symptomer.

Det er normalt, at man får problemer med optagelse af lægemidler, når man har Parkinsons sygdom. Det skyldes, at tømningen af mavesækken ud i tarmen, hvor lægemidlet bliver optaget, går langsommere. Det gør, at virkningen af tabletbehandling kan blive uforudsigelig. Når lægemidlet gives direkte i tarmen som med LECIGON®, bliver det optaget i blodet, uden at blive påvirket af mavesækkens tømning.

Hvordan gives lægemidlet?

LECIGON® gives via en bærbar pumpe (Crono® LECIG) og en sonde direkte ind til den øverste del af tyndtarmen. LECIGON® udleveres i cylinderampuller, som sluttes til pumpen. Pumpen bliver derefter koblet til en mavesonde. I denne mavesonde ligger en tyndere slange, som går ned til tarmen, hvor lægemidlet bliver optaget. Pumpen er 8 x 6 cm, og den vejer sammen med lægemidlet i alt 222 g. Den kan bæres i lommen, hænges rundt om halsen eller sættes fast i et bælte.

Hvor hurtigt virker LECIGON®?

Når du starter pumpen, gives en morgendosis, som virker inden for 30 minutter. For at bibeholde virkningen i løbet af dagen, fortsætter pumpen med automatisk at give en kontinuerlig dosis. Du har også mulighed for at give ekstradoser, for at lindre symptomer ved midlertidige udsving i virkningen.

Hvad er LECIGON®-test?

Inden sonden bliver indopereret, kan lægen vælge at kontrollere, hvordan behandlingen virker for dig, med en test. LECIGON® gives da via en sonde, som går igennem næsen, svælget og mavesækken og ned til tyndtarmen. Formålet med testen er, at du skal føle dig helt tryg ved behandlingen, inden du beslutter dig. Sonden skal sidde et par dage, og du får mulighed for at prøve LECIGON® hjemme eller på sygehuset.

Hvordan anlægges en sonde, og hvordan fungerer den?

En mavesonde anlægges med gastroskopi. Det sker normalt i lokalbedøvelse med et beroligende middel eller narkose. I sonden løber en tyndere slange, som giver LECIGON® i tarmen. Operation og dosistilpasning udføres i samarbejde med din neurolog. Du får en indkaldelse, der fortæller, hvor du skal møde op, og hvilke forberedelser, du skal gøre inden indlæggelsen.

Skal jeg fortsat tage andre Parkinson-lægemidler?

Du skal tage de lægemidler, lægen har ordineret. LECIGON® er et lægemiddel, som kan tages døgnet rundt, enten alene eller i kombination med andre lægemidler.

Hvordan opbevares LECIGON®?

Opbevares i køleskab (2 °C–8 °C) Beskyttes mod lys. Til engangsbrug og hver cylinderampul må ikke anvendes i mere end 24 timer, selvom der er lægemiddel tilbage. (Hvis du har haft pause i behandlingen i løbet af natten, kan du fortsætte med den påbegyndte cylinderampul næste dag, men kun i op til 24 timer efter, at den blev åbnet). Leveres i æske med 7 cylinderampuller. Du får normalt udleveret 3–4 æsker pr. gang på apoteket. LECIGON® kan blive svagt gulligt/rødligt i slutningen af holdbarhedsperioden. Det påvirker ikke virkningen af behandlingen. Spørg apotekspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål til medicinen.

Teknisk support
Telefonnummer: +45 33 60 43 00
E-mail: PD-support-dk@adxto.com

Hvorfor er der tilknyttet en support til LECIGON®?

Det er vigtigt at føle sig tryg ved sin behandling, og derfor er der en support tilknyttet lægemidlet og pumpen. Supporten er til for dig, som bruger og/eller pårørende/sygeplejerske/hjemmepleje m.m. Vi informerer og underviser i behandlingen i hele landet på foranledning af plejepersonalet.

Du eller dine pårørende er naturligvis velkomne til at kontakte os direkte med spørgsmål enten på mail eller telefon.

nordic INFUcare

Distr: NordicInfu Care AB
Industrivej 21, 4000 Roskilde
Tlf +45 70 28 10 24

Producent av Crono LECIG®pumpe:
CANÈ S.p.A. Italia. www.canespa.it

LECI.DK.029-02-FEB2024