Kako koristiti napunjenu špricu innohep®

Informacije za bolesnike kojima je propisan lijek innohep®. Prije nego što započnete s liječenjem, pažljivo pročitajte uputu o lijeku. Sjednite, lezite ili stanite u takav položaj da možete vidjeti kožu na mjestu na kojem ćete ubrizgati injekciju. Vrsta injekcije koju dajete je poznata kao potkožna injekcija. Injekcija ide u stisnuti masni sloj odmah ispod kože, u skladu s uputstvom od doktora ili medicinske sestre. Držite se podalje od područja pupka i mjesta primjene nedavnih injekcija. NEMOJTE ubrizgavati u mišić ili krvne žile. Trebali biste injekciju davati svaki dan u isto vrijeme. Operite i osušite ruke prije davanja injekcije.

1. Odaberite mjesto ubrizgavanja. Masno tkivo donjeg dijela trbuha udaljeno najmanje 5 cm od pupka uobičajeno je mjesto ubrizgavanja. Očistite mjesto ubrizgavanja alkoholom i pustite da se osuši. Ako abdomen nije prikladan za injekciju, pogledajte alternativna mjesta ubrizgavanja u nastavku.

2. Izvadite špricu iz cjevčice tako da potpuno savijete obojeni poklopac na cjevčici. Pregledajte špricu da osigurate da nije zamagljena i da ne sadrži nikakve taloge. Ako je to slučaj, odaberite drugu špricu.

3. Savijte narandžasti sigurnosni uređaj prema dolje dalje od sivog poklopca igle. Skinite zaštitni poklopac igle okretanjem i izvlačenjem ravno prema van, bez savijanja igle. Izbjegavajte dodirivanje sterilne igle.

4. Šprice sadrže zračni mjehurić koji ne treba izbaciti prije injekcije. Podesite količinu u šprici prema potrebnoj dozi koju je propisao ljekar. Prekomjernu količinu treba ukloniti pritiskom na klip šprice u okomitom smjeru prema gore. Orijentirajte se prema gradaciji na šprici.

5. Podignite nabor na koži između palca i kažiprsta. Umetnite iglu potpuno, okomito u odnosu na kožu i polako ubrizgajte dozu u potkožno masno tkivo. Izvucite iglu do pola i izbrojite do 10. Zatim potpuno izvucite iglu.

6. Koristeći tvrdu površinu, savijte narandžasti sigurnosni uređaj tako da sada pokazuje u istom smjeru kao i igla (natrag u svoj izvorni položaj). Zatim, pomoću sigurnosnog uređaja postavljenog ravno na tvrdoj površini, nježno gurnite prema dolje dok igla ne škljocne u uređaju.

7. Iskorištenu špricu vratite u plastični spremnik. Gurnite poklopac cjevčice prema dolje dok ne čujete da je kliknuo na svoje mjesto. Šprica je sad zaštićena i može se odbaciti. Korištene, zaštićene šprice možete vratiti u bolnicu ili apoteku.

8. Sljedeći put odaberite drugo mjesto ubrizgavanja. Prebacujte se između desne i lijeve strane.



9. Alternativna mjesta ubrizgavanja su vanjski dijelovi bedara ili stražnja strana nadlaktice. Tehnika je ista kao i kod ubrizgavanja u abdomen.

10. Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema, obratite se svom ljekaru ili medicinskoj sestri.

11. Također možete pogledati videozapis s uputstvima za korištenje i ubrizgavanje lijeka innohep®. Idite na www.medicinstruktioner.se ili www.fass.se i potražite innohep® ili skenirajte QR kod na mobilnom uređaju ili tabletu. Dostupni su titlovi na nekoliko jezika.

LEO Pharma AB | Box 404 | 201 24 Malmö | Tel.: 040-352200
Mail: info.se@leo-pharma.com
LEO® MAT-62050 VER 2.0 © LEO | JULY 2024
ALL TRADEMARKS MENTIONED BELONGS TO LEO PHARMA A/S.