

PATIENTINFORMATION

– TILL DIG SOM SKA BEHANDLAS
MED WEZENLA (ustekinumab) f r fylld injektionspenna

**Distribueras endast
via v rdpersonal**



WEZENLA[®]
(Ustekinumab)

INNEHÅLL

- 3** WEZENLA - Vad det är och vad det används för
- 4** Att tänka på innan du använder WEZENLA
- 5** Biverkningar
- 8** Introduktion av WEZENLA förfylld injektionspenna
- 9** **Steg 1:** Viktig information som du behöver veta innan du injicerar WEZENLA
- 10** **Steg 2:** Förbereda för att injicera WEZENLA
- 12** **Steg 3:** Förbereda för injektionen
- 14** **Steg 4:** Injicera WEZENLA
- 18** **Steg 5:** Slutför och kasta WEZENLA
- 19** Resa med förfylld injektionspenna
- 20-22** Injektionsschema



WEZENLA (ustekinumab) – VAD DET ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Din läkare har skrivit ut WEZENLA (ustekinumab) åt dig. WEZENLA är ett biologiskt läkemedel som injiceras under huden med hjälp av en förfylld injektionspenna.

WEZENLA tillhör en grupp läkemedel som kallas ”immunsuppressiva medel”. Dessa läkemedel verkar genom att hämma en del av immunförsvaret vilket leder till minskad inflammation.

Första gången du ska behandla dig med WEZENLA förfylld injektionspenna, kommer din läkare eller sköterska att gå igenom hur du använder den.

Tanken med den här broschyren är att du ska känna dig trygg med att injicera WEZENLA och broschyren visar dig steg för steg hur du ska gå till väga.

DIN LÄKARE HAR SKRIVIT UT WEZENLA TILL DIG FÖR DIAGNOSEN:

Läs alltid bipacksedeln som följer med förpackningen och rådfråga din läkare eller sjuksköterska om du har frågor om din behandling.

● ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER WEZENLA

Använd **inte** WEZENLA om du vet med dig att du är allergisk mot ustekinumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel eller om du har en aktiv infektion. Tala om för läkaren om du nyligen har haft en infektion.

Tala om för läkaren om du har några **andra sjukdomar** före varje behandling, eller om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tala även om för läkaren om du nyligen varit i kontakt med någon som kan ha haft tuberkulos.

Berätta för din läkare om du **nyligen har vaccinerat** dig eller står i begrepp att göra det. Vissa typer av vaccin (levande vacciner) ska inte ges samtidigt som du använder WEZENLA.

Berätta för din läkare om du snart ska **genomgå en operation** eller ett **tandingrepp**.

Berätta om du planerar att skaffa barn eller är gravid, då detta kan påverka läkarens beslut om behandlingsval. Om du är en fertil kvinna, rekommenderas du att **undvika** att bli gravid och måste använda effektiva preventivmedel under behandlingen med WEZENLA och i minst 15 veckor efter avslutad behandling.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder WEZENLA.

● BIVERKNINGAR

WEZENLA kan liksom alla läkemedel orsaka biverkningar, inklusive allergiska reaktioner och infektioner. De flesta är lindriga och måttliga, men vissa kan vara allvarliga. Du måste vara uppmärksam på vissa tecken på sjukdom när du tar WEZENLA.

! **Allergiska reaktioner - dessa kan behöva akut vård. Tala om för läkaren eller sök akut läkarhjälp om du märker något av följande symtom.**

- Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) är sällsynta hos personer som tar WEZENLA. Symtomen inkluderar:
 - svårighet att andas eller svälja.
 - lågt blodtryck, vilket kan orsaka yrsel eller svindel.
 - svullnad av ansikte, läppar, mun eller hals.
- Vanliga tecken på en allergisk reaktion inkluderar hudutslag och nässelutslag.

I sällsynta fall har allergiska lungreaktioner och lunginflammation rapporterats. Tala omedelbart om för läkare om du utvecklar symtom som hosta, andnöd och feber.

Infektioner kan behöva akut vård. Tala om för läkaren omedelbart om du märker något av följande tecken.

- Infektioner i näsa eller svalg och vanlig förkylning.
- Infektioner i luftvägarna.
- Inflammation i vävnaden under huden (cellulit).
- Bältros (en typ av smärtsamma utslag med blåsor).

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Läs mer om biverkningar i bipacksedeln som medföljer kartongen eller på fass.se

● OM DU ANVÄNT MER WEZENLA ÄN DU BORDE

Om du använt eller någon annan har gett dig för stor mängd WEZENLA, kontakta genast läkare eller apotekspersonal. Ta alltid med läkemedlets ytterkartong, även om den är tom.

● OM DU HAR GLÖMT ATT ANVÄNDA WEZENLA

Om du glömmet att ta en dos, kontakta läkare eller apotekspersonal. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

● HUR WEZENLA SKA FÖRVARAS

- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvara WEZENLA i kylskåp (2°C - 8°C). Läkemedlet får ej frysas.
- Förvara den förfyllda injektionspennan i ytterkartongen då läkemedlet är känsligt för ljus.
- Vid behov kan enskilda WEZENLA förfyllda injektionspennor även förvaras i rumstemperatur vid högst 30°C under en period på upp till 30 dagar. När en förfylld injektionspenna har förvarats i rumstemperatur ska den inte läggas tillbaka i kylan.
- Kassera oanvänd injektionspenna som förvarats i rumstemperatur i 30 dagar eller mer eller om det ursprungliga utgångsdatumet angiven på förvaringskartongen har passerat, beroende på vilket av dessa alternativ som inträffar först.
- Förfyllda injektionspennor med WEZENLA får inte skakas. Om läkemedlet skakas kraftigt under en längre tid kan det förstöras.


Injektionspennan eller läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.



INTRODUKTION AV WEZENLA FÖRFYLLED INJEKTIONSPENNA (CONFIPEN)

Med den förfyllda injektionspennan ges WEZENLA som en injektion under huden (subkutan injektion). Se bipacksedeln för information om läkemedlet.


DEN FÖRFYLLEDA PENNANS DELAR



VIKTIG INFORMATION SOM DU BEHÖVER VETA INNAN DU INJICERAR WEZENLA

DOSERING:

- WEZENLA finns i två olika doser: 45 mg/0,5 ml och 90 mg/1,0 ml. Kontrollera på receptet att du har rätt dos.
- Den förfyllda injektionspennans etikettfärg och fönsterstorlek beror på vilken dos den innehåller. Läkemedelsmängden i den förfyllda injektionspennan beror också på vilken dos den innehåller.



45 mg/0,5 ml 90 mg/1,0 ml

- ! Om din dos är 90 mg får du antingen en förfylld injektionspenna på 90 mg eller två förfyllda injektionspennor på 45 mg.
- Om du får två förfyllda injektionspennor på 45 mg för 90 mg-dos måste du ge dig själv en andra injektion direkt efter den första.
- Upprepa stegen 1-14 för den andra injektionen med en ny förfylld injektionspenna.
- Välj ett annat injektionsställe för den andra injektionen.

ANVÄNDA DEN FÖRFYLDA WEZENLA-INJEKTIONSPENNAN:


- ! Håll den förfyllda injektionspennan och behållaren för skärande/stickande avfall utom syn- och räckhåll för barn.
- × Det är viktigt att du eller din vårdnadsgivare **inte** försöker att injicera dig om ni inte har utbildats i tekniken av din läkare eller vårdgivare.
- × Använd **inte** den förfyllda injektionspennan om kartongen är skadad eller förpackningen är bruten.
- × Använd **inte** den förfyllda injektionspennan efter utgångsdatumet på etiketten.
- × Den förfyllda injektionspennan får **inte** skakas.
- × Ta **inte** bort locket från den förfyllda injektionspennan förrän du är redo att injicera.
- × Använd **inte** den förfyllda injektionspennan om den har varit fryst.
- × Använd **inte** den förfyllda injektionspennan om den har tappats på ett hårt underlag. En del av den förfyllda injektionspennan kan vara trasig även om du inte kan se att den har gått sönder. Använd om tillgängligt en ny förfylld injektionspenna och ring din läkare eller vårdgivare.

FÖRBEREDA FÖR ATT INJICERA WEZENLA

1. VÄNTA 30 MINUTER PÅ ATT DEN FÖRFYLLEDA INJEKTIONSPENNAN SKA NÅ RUMSTEMPERATUR.

! Vänta 30 minuter

- Ta ut det antal förfyllda injektionspennor som du behöver för injektionen från kylskåpet.
- Låt den förfyllda injektionspennan värmas upp på naturligt sätt.
- ✗ Värm **inte** upp den förfyllda injektionspennan med varmt vatten, mikrovågsugn eller direkt solljus.
- ✗ Lägg **inte** tillbaka den förfyllda injektionspennan i kylskåpet efter att den har nått rumstemperatur.
- ✗ Den förfyllda injektionspennan får **inte** vid något tillfälle skakas.
- Att använda den förfyllda injektionspennan när den har nått rumstemperatur säkerställer att hela dosen ges och det blir behagligare att injicera.




2. INSPEKTERA LÄKEMEDLET. DET SKA VARA KLART TILL OPALESCENT, FÄRGLÖST TILL SVAGT GULT.


- Det gör inget om det syns luftbubblor i den förfyllda injektionspennan.
- ✗ Använd **inte** WEZENLA om läkemedlet är fryst, grumligt, missfärgat eller om det innehåller främmande partiklar.

3. KONTROLLERA UTGÅNGSDATUMET (EXP) OCH INSPEKTERA DEN FÖRFYLLEDA INJEKTIONSPENNAN FÖR SKADOR.

- ✗ Använd **inte** den förfyllda injektionspennan om utgångsdatumet har passerat.
- ✗ Använd **inte** den förfyllda injektionspennan om:
 - locket saknas eller är löst.
 - den är sprucken eller har trasiga delar.
 - den har tappats på ett hårt underlag.
- Kontrollera att du har rätt läkemedel och dos.




4. PLOCKA FRAM FÖLJANDE ARTIKLAR FÖR INJEKTIONEN OCH LÄGG DEM PÅ EN REN, PLAN OCH VÄL UPPLYST PLATS:



- WEZENLA förfylld injektionspenna (rumstempererad)
- Behållare för skärande/stickande avfall
- Alkoholservett
- Plåster, och
- Bomullstuss eller kompress

FÖRBEREDA FÖR INJEKTIONEN

5. VÄLJ ETT AV DESSA INJEKTIONSSTÄLLEN.



- Välj framsidan av låret eller magen (med undantag för området 5 cm närmast naveln).
- Någon annan kan injicera dig i låret eller magen.

- ! Undvik områden med ärr och bristningar och där huden är öm, har blåmärken eller är röd eller hård. Undvik om möjligt hudområden med tecken på psoriasis.


6. TVÄTTA HÄNDERNA NOGGRANT MED TVÅL OCH VATTEN.

7. RENGÖR INJEKTIONSSTÄLLET MED EN ALKOHOLSERVETT.

- Låt huden självtorka.
- ✗ Du får **inte** vidröra området igen innan du injicerar.

INJICERA WEZENLA

- ! Ta av locket först när du kan injicera direkt (inom 5 minuter) eftersom läkemedlet annars kan torka ut. Sätt inte tillbaka locket.



8. FATTA TAG I DEN FÖRFYLLDA INJEKTIONSPENNAN SÅ ATT DU SER FÖNSTRET. DRA HÅRT FÖR ATT TA AV LOCKET. DU KAN BEHÖVA VRIDA LOCKET FÖR ATT TA AV DET.

✗ Sätt **aldrig** tillbaka locket. Det kan skada nålen.

- Det är normalt att se en droppe läkemedel i änden av nålen eller det gula säkerhetsskyddet.

- ! Rör eller tryck inte på det gula säkerhetsskyddet. Sätt inte fingret i det gula säkerhetsskyddet.

9. NYP IHOP HUDEN FÖR ATT SKAPA EN SPÄND YTA PÅ INJEKTIONSSTÄLLET. SÄTT DET GULA SÄKERHETSSKYDDET RAKT MOT DEN HOPNYPTA HUDEN.

- Fortsätt att nypa ihop huden tills injektionen har genomförts.
- Du ska kunna se fönstret.
- Placera den förfyllda injektionspennan rakt mot injektionsstället (i 90 graders vinkel).




10. TRYCK DEN FÖRFYLLDA INJEKTIONSPENNAN BESTÄMT NEDÅT TILLS DET GULA SÄKERHETSSKYDDET SLUTAR ATT RÖRA SIG.

Håll ned injektionspennan, lyft inte upp den.

- Nålen förs in automatiskt och injektionen börjar.
- Du kanske hör eller känner ett klick.
- Håll den förfyllda injektionspennan rakt och stadigt mot huden.


TRYCK OCH HÅLL ned för att starta injektionen



11. FORTSÄTT ATT TRYCKA NED DEN FÖRFYLLEDA INJEKTIONSPENNAN. VÄNTA TILLS FÖNSTRET BLIR HELT GULT.


- Injektionen kan ta upp till 15 sekunder. Du kanske hör eller känner ett klick.
- Efter att fönstret har blivit helt gult, lyft bort den förfyllda injektionspennan från huden.

- ! TITTA
- fönstret kommer att bli helt gult.



KONTROLL AV INJEKTIONSSTÄLLET OCH KASSERING

12. BEKRÄFTA ATT EN HEL DOS LÄKEMEDEL HAR INJICERATS.



✗ Rör **inte** det gula säkerhetsskyddet.

- En liten mängd vätska på injektionsstället gör ingenting.

! OM INTE FÖNSTRET BLIR HELT GULT, OM DET VERKAR SOM ATT LÄKEMEDEL FORTFARANDE KOMMER UT, ELLER OM DU SER FLERA DROPPAR AV LÄKEMEDEL HAR DU INTE FÅTT EN HEL DOS. RING LÄKARE ELLER VÅRDGIVARE OMEDELBART.

13. KONTROLLERA INJEKTIONSSTÄLLET.


- ✗ Gnugga **inte** på injektionsstället.
- Om det blöder, tryck en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället.
- Sätt på ett plåster om det behövs.



14. LÄGG DEN ANVÄNDA FÖRFYLLEDA INJEKTIONSPENNAN OCH LOCKET I BEHÅLLAREN FÖR SKÄRANDE/STICKANDE AVFALL.

! KASTA INTE DEN FÖRFYLLEDA INJEKTIONSPENNAN
BLAND HUSHÅLLSAVFALL.

- ✗ Återanvänd **inte** den förfyllda injektionspennan.
- ✗ Rör **inte** det gula säkerhetsskyddet.



Eventuellt kvarvarande läkemedel i den förfyllda injektionspennan ska kastas. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

RESA MED INJEKTIONSPENNAN

Vid behov kan enskilda WEZENLA förfyllda injektionspennor även förvaras i rumstemperatur vid högst 30°C under en period på upp till 30 dagar. Den förfyllda injektionspennan är ljuskänslig och ska förvaras i originalkartongen. När en injektionspenna har förvarats i rumstemperatur (vid högst 30° C) ska den inte läggas tillbaka i kylan.

Kassera oanvänd penna som förvarats i rumstemperatur i 30 dagar eller mer eller om det ursprungliga utgångsdatumet angiven på ytterkartongen har passerat, beroende på vilket av dessa alternativ som inträffar först.

Om du reser med flyg ska du i förväg fråga flygbolaget eller lämplig myndighet om du kan ta med den förfyllda injektionspennan ombord i handbagaget och om den kan kylas under flygresan.

Du bör ha med dig ett recept på WEZENLA och ett brev från din läkare (travelcard) ifall du behöver förklara i tullkontrollen och säkerhetskontrollen på flygplatsen varför du har med dig den förfyllda injektionspennan.

Om du har frågor eller behöver mer information, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.



För mer information, läs alltid bipacksedeln som medföljer förpackningen alternativt online på FASS allmänhet (www.fass.se).

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

AMGEN

SWE-654-0425-80001 november 2025

©2025 Amgen Inc. All rights reserved.

Amgen AB | www.amgen.se

