

Patientinformation

Till dig som behandlas med Praluent®




Praluent®
alirocumab

SANOFI 

Ateroskleros, åderförfettning, är den viktigaste riskfaktorn för hjärtinfarkt och stroke. Blodfetter lagras i kärlväggarna och blodförsörjningen till viktiga organ som hjärta och hjärna försämras. Det är därför viktigt att sänka nivåerna av farliga blodfetter.

Denna broschyr har vi skrivit till dig som har förhöjda blodfetter och har blivit ordinerad Praluent® av din läkare.

Målet med din behandling är:


- Att sänka halten av LDL-kolesterol i blodet.
- Att sänka halterna av andra sjukdomsframkallande fettpartiklar i blodet.
- Att minska risken för att insjukna i hjärtinfarkt och stroke.

Injicera Praluent varannan vecka (doserna 75 mg eller 150 mg) eller var fjärde vecka (dosen 300 mg).
För att ta dosen 300 mg, ta två injektioner med 150 mg efter varandra på två olika injektionsställen.

För enkelhetens skull, bestäm dig för att injicera jämna eller ojämna veckor. Det är viktigt att du följer din läkares ordination och meddelar sjukvården om du av någon anledning frångår given ordination. Om det är något du undrar över vad gäller din behandling, tveka aldrig att fråga din sjuksköterska eller läkare.


[Din sjukvårdskontakt:](#)

Praluent® förfylld penna




Innan du tar injektionen


1. Låt pennan bli varm i rumstemperatur 30-40 minuter. Rumstemperaturen ska vara 18-25 °C.
2. Tvätta händerna med tvål och vatten.
3. Kontrollera utgångsdatum, använd ej om datum gått ut.
4. Titta i pennfönstret, om det är GULT använd EJ.




Förbered injektionsstället



Ta fram pennan
30-40 min innan




Alkoholservett




Bomullstuss

- Du kan injicera på lår, överarm eller mage (mer än 5 cm från naveln).
- Tvätta händerna med tvål och vatten och rengör sedan huden på injektionsområdet med en alkoholservett.
- Injicera ej i hud som är öm, hård, röd eller varm.
- Injicera ej i område nära en synlig ven.
- Undvik att sticka dig på exakt samma ställe varje gång.




Utför injektion

1




Dra av den blå skyddshylsan.

2



Håll pennen som på bilden.


3




Kläm ihop huden (gäller ej överarm) vid injektionsstället.

Håll pennen mot huden i 90° vinkel, med fönstret mot dig, med ett lätt tryck så att det gula nålskyddet ej syns.


4




Tryck ned den blå knappen med tummen och släpp sedan upp den omedelbart. Du hör ett klickljud, injektionen startar.



Håll kvar pennan mot huden.
Fönstret på pennan ska bli helt gult. Injektionen kan ta upp till 20 sekunder.




Gnid inte huden efter injektion.
Tryck vid behov en bomullstuss mot injektionsstället.



Släng pennan i avsedd behållare.

Glöm inte att notera i dagboken!



Allmän information

- Läkemedlet ska injiceras varannan eller var fjärde vecka vid ungefär samma tid.
- Missad dos:
 - Inom 7 dagar, ta injektionen.
 - Om mer än 7 dagar, hoppa över injektionen och återuppta behandling två veckor efter dagen för den missade dosen.
- Förvara pennan i kylskåp (2°C till 8°C). Praluent kan förvaras utanför kylskåp (vid högst 25°C) skyddat från ljus under en sammanhängande period av högst 30 dagar.
- Efter att läkemedlet tagits ut från kylskåpet måste det användas inom 30 dagar eller kasseras.
- Förvara pennan i ytterförpackningen, pennan är ljuskänslig. Utsätt ej pennan för hög värme (över 25°C) eller frysgrader.
- Du ser kanske en luftbubbla. Det är normalt. Om injektorfönstret är sprucket - använd ej pennan!
- Om pennan ej hanteras enligt ovan - använd ej!

Snabbguide

- Ta fram pennan och lägg i rumstemperatur i 30-40 min.
- Tvätta händerna och sätt dig bekvämt.
- Rengör injektionsstället med en alkoholservett.
- Tryck den förfyllda pennan mot huden för att säkerställa att du hamnar i en bra och bekväm position. Håll pennan så att fönstret är riktat mot dig.
- Utför injektionen.

Tips

Påminnelse att du ska ta din injektion:

- Notera i t.ex. almanacka eller som påminnelse i telefon eller surfplatta.
- Starta Praluent timer.
- Planera i god tid hur du ska sköta din Praluent® medicinerings i samband med resa, tala med din läkare hur du bäst gör detta.
- Om ej injektionen fullföljs, kontakta sjukvården för råd.

Frågor om Praluent® förfylld penna:

www.medicininstruktioner.se

www.fass.se

08-634 50 00

Läs bipacksedeln noggrant.

Till Medicininstruktioner
Praluent för patienter:



Hur man skapar en påminnelse
varannan vecka i sin iPhone:



PRALUENT® (alirokumab), injektionsvätska i förfyllda injektionspennor 75 mg och 150 mg. Receptbelagt läkemedel. **Indikation:** PRALUENT används till vuxna med höga kolesterolnivåer i blodet (hyperkolesterolemi, heterozygot familjär och icke-familjär, samt blandad dyslipidemi) samt till vuxna med höga kolesterolnivåer i blodet och med hjärt-kärlsjukdom, för att minska risken för hjärt-kärlhändelser. Det ges tillsammans med en statin (ett vanligt läkemedel för behandling av högt kolesterol) eller statin i kombination med andra kolesterolsänkande läkemedel, om den högsta statindosen inte sänker kolesterolnivåerna tillräckligt eller, ensamt eller tillsammans med andra kolesterolsänkande läkemedel när statiner inte kan användas eller när patienten inte tål statiner. **Varningar och försiktighet:** Berätta för läkare om du har någon njur- eller leversjukdom innan du börjar använda detta läkemedel. För ytterligare information, se www.fass.se. **Kontaktuppgifter:** PRALUENT tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com.

Läs bipacksedeln nogå före användning.

▼ Detta läkemedel är föremål för ökad övervakning.


Praluent®
alirokumab