

Guide med vanliga frågor för patienter som använder Xyrem®

Här är några frågor som du kanske har angående ditt intag av Xyrem®. Prata med sjukvårdspersonal angående andra eventuella frågor du har, och läs igenom bipacksedeln som kom tillsammans med flaskan med läkemedel.

1. Vad är Xyrem®?

Xyrem® är ett oralt receptbelagt läkemedel som används för att behandla vuxna som:

- ofta somnar dagtid och vid oväntade tillfällen (narkolepsi);
- plötsligt drabbas av muskelsvaghet eller förlamning (kataplexi) när de upplever starka känslor.

2. Får jag dricka alkohol medan jag tar Xyrem®?

Nej, du får inte dricka alkohol medan du tar Xyrem®. Xyrem®s effekter kan förstärkas och du kan uppleva nedsatt andning (andningsdepression) som kan vara dödlig. Du kan också uppleva nedsatt tankeförmåga eller förvirring.

3. Vilka allvarliga biverkningar har Xyrem®?

Andningsbesvär (andningsdepression)

Xyrem® kan påverka din andning. Om du har några andnings- eller lungproblem bör du informera din läkare innan du tar Xyrem®. Om du är överviktig har du också ökad risk för andningsdepression. Du bör inte dricka alkohol eftersom detta också kan öka risken för andningsdepression. Andningsdepression kan vara allvarlig och även dödlig.

Depression och självmordstankar

Om du känner dig nedstämd eller har några tankar på att skada dig själv medan du tar Xyrem[®] bör du genast informera din läkare. Du bör också informera din läkare om du tidigare har drabbats av depression.

Sänkt medvetandegrad

Eftersom Xyrem[®] verkar direkt på hjärnan orsakar det dåsigheit och kan sänka din medvetandegrad. Detta kan leda till koma och kan vara dödligt. Det är viktigt att du inte dricker alkohol medan du tar Xyrem[®]. Du bör inte ta några andra läkemedel som orsakar dåsigheit. Du bör inte heller köra bil eller använda maskiner under minst 6 timmar efter att du tagit Xyrem[®].

Epileptiska anfall

Xyrem[®] kan orsaka epileptiska anfall. Innan du tar Xyrem[®] bör du tala om för din läkare om du har haft epileptiska anfall tidigare.

Beroende/missbruk/felanvändning

Den aktiva substansen i Xyrem[®] är gamma-natriumoxibat (GHB). GHB är en substans som har missbrukats och felanvänts. Din läkare kommer därför att specifikt fråga dig om du har missbrukat läkemedel tidigare. Missbruk och felanvändning av Xyrem[®] är farligt och kan leda till döden.

Dessa är inte alla Xyrem[®]s biverkningar. Tala med din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar.

4. Är Xyrem[®] säkert att använda tillsammans med andra läkemedel?

Som med alla andra läkemedel är det väldigt viktigt att du berättar för din läkare om andra läkemedel som du tar, inklusive icke-receptbelagda läkemedel. Xyrem[®] bör inte användas i kombination med läkemedel som orsakar dåsigheit eller med läkemedel såsom narkotiska smärtstillande medel som kan orsaka dämpning av det centrala nervsystemet. Tala om för din läkare om du tar läkemedel som ökar aktiviteten i det centrala nervsystemet, antidepressiva läkemedel, eller läkemedel som omsättes på liknande sätt i kroppen, såsom valproat, topiramet, fenytoin eller etosuximid.

Be sjukvårdspersonal om ett Xyrem[®] Patientkort som du kan bära med dig för att påminna dig om hur Xyrem[®] ska användas. Visa detta kort för alla läkare som behandlar dig så att de vet att du tar Xyrem[®], särskilt om de skriver ut läkemedel till dig.

5. Vad ska jag göra om jag råkar ta mer än den förskrivna dosen?

Se till att genast söka akut hjälp om du tar för mycket Xyrem® (överdos).

Att ta för mycket Xyrem® kan orsaka symptom såsom agitation, förvirring, försämrad rörlighet, försämrad andning, suddig syn, överdriven svettning, huvudvärk, kräkningar och sänkt medvetandegrad vilket kan leda till koma och epileptiska anfall. Det underlättar för sjukvårdspersonalen att ta hand om dina symptom om du tar med dig den märkta läkemedelsflaskan, även om den är tom.

6. Vad händer om jag plötsligt slutar att ta Xyrem®?

Om du plötsligt slutar att ta Xyrem® kan du uppleva abstinens. Du kanske märker att de kataplektiska anfällen återkommer och, i ovanliga fall kan du drabbas av sömnlöshet, huvudvärk, ångest, yrsel, sömnsvårigheter, trötthet, hallucinationer och onormala tankar.

7. Vilka andra viktiga saker behöver jag veta om att ta Xyrem®?

- Dela inte Xyrem® med någon.
- Använd endast den dos som din läkare skrivit ut till dig. Om du anser att dosen behöver ändras, kontakta din läkare.
- Var noga med att vänta minst 2 timmar efter en måltid innan du tar Xyrem®.
- Förvara alltid Xyrem® på en säker plats i originalförpackningen.
- Förvara Xyrem® utom syn- och räckhåll för barn
- Lämna tillbaka oanvänt läkemedel till ditt apotek
- Tala omedelbart om för din läkare om du upplever ovanliga symptom som till exempel konstiga tankar, inklusive tankar på att skada andra, medan du tar Xyrem®.

XYREM®

UCB Xyrem Vanliga frågor och svar, v2.2

© Copyright UCB Biopharma SPRL 2017, med ensamrätt.

Denna information är en del av det riskhanteringsprogram som är ett krav från EMA.



UCB Pharma AB
Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm
Tel: +46 40 294 900
Email: info.ucbnordic@ucb.com