

Arabiska

معلومات المريض
للمرضى الذين وصف لهم
Suliqua

هذه النشرة مخصصة لك لأنك مصاب بمرض السكري ووصف لك طبيبك Suliqua (أنسولين غلارجين + ليكسييسينايد). الهدف الرئيسي من كل علاجات مرض السكري هو بلوغ مستوى طبيعي لسكر دم قدر الإمكان، والتمتع بحالة صحية جيدة في الوقت نفسه.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول علاج مرض السكري الخاص بك، فلا تتردد مطلقاً في طرحها على ممرضتك أو طبيبك.

ما هو Suliqua وما هي دواعي استعماله

يُستخدم Suliqua كعلاج لمرض السكري من النوع 2 لدى البالغين، لتنظيم مستويات السكر في الدم عندما تكون مرتفعة جدًا. يتم إعطاء Suliqua جنبًا إلى جنب مع الميتفورمين عندما لا تكون الأدوية الأخرى كافية للسيطرة على مستويات السكر في دمك.

ويمكن أن تشمل هذه الأدوية الأخرى أدوية مرض السكري المتاحة في شكل أقراص (مثل أدوية الميتفورمين، والسلفونيلوريا) أو الأنسولين.

إذا كنت تستخدم علاجًا آخرًا لمرض السكري، فتحدث مع طبيبك حول ما إذا كان يجب التوقف عن تناول ذلك الدواء عند بدء استخدام Suliqua.

Suliqua هو دواء حقن يُستخدم كعلاج لمرض السكري ويحتوي على مادتين فعاليتين:

- أنسولين غلارجين - هو نوع من الأنسولين طويل المفعول يساعد على تنظيم السكر في الدم على مدار 24 ساعة في اليوم.
- ليكسيسيناتييد - يُسمى متناظر GLP-1، وهو يساعد الجسم على إنتاج الأنسولين الخاص به كرد فعل لزيادة السكر في الدم ويعمل على أن يتم امتصاص السكر من المواد الغذائية بشكلٍ أبطأ.



كيفية استخدام Suliqua

قد يوصيك طبيبك باستخدام Suliqua مع أدوية أخرى لعلاج ارتفاع نسبة السكر في الدم.

استخدم هذا الدواء دائماً وفقاً لتعليمات طبيبك. قد يخبرك طبيبك باستخدام جرعة مختلفة عن جرعة الأنسولين السابقة. استشر طبيباً، أو صيدلياً، أو ممرضة إذا لم تكن متأكدًا.

بناءً على نمط حياتك، ونتيجة اختبار السكر في دمك، وعلاج الأنسولين السابق الذي كنت تستخدمه، سيقوم الطبيب بإبلاغك بـ:

- مقدار Suliqua الذي سوف تحتاجه كل يوم وفي أي وقت من اليوم.
- متى تقوم بفحص مستوى السكر في دمك وما إذا كان يجب عليك إجراء اختبار بول.
- متى يتعين عليك زيادة الجرعة أو خفضها.



المقدار الذي ينبغي عليك استخدامه

Suliqua عبارة عن قلم حقن مسبق الملاء يحتوي على 100 وحدة/مل + 33 ميكروجرام/مل:

- يعطي هذا القلم جرعات من خلال 30 إلى 60 درجة جرعة في الحقنة الواحدة، بدرجات تزيد بمعدل درجة جرعة واحدة.

- تحتوي كل درجة جرعة تقوم بلفها للأمام على وحدة واحدة من أنسولين غلارجين و0.33 ميكروجرام من ليكسيسيناتييد.

يتم إعطاؤك جرعة Suliqua كدرجات جرعات. تبين نافذة الجرعة الموجودة في قلم الحقن عدد درجات الجرعات من Suliqua التي سيتم حقنها. لا تحقن جرعة أكبر من 60 درجة جرعة.

متى يتم حقن Suliqua


إذا كنت قد استخدمت جرعة أكثر مما ينبغي من Suliqua إذا قمت بحقن جرعة أكثر مما ينبغي من هذا الدواء، فقد ينخفض مستوى السكر في دمك (نقص سكر الدم). افحص مستوى السكر في دمك وتناول المزيد من الطعام لمنع سكر الدم من الانخفاض بشدة.

استخدم Suliqua مرة واحدة يوميًا، في غضون ساعة واحدة قبل أن تتناول وجبة طعام. يُفضل أن يتم حقن Suliqua قبل نفس الوجبة كل يوم، بعد أن تكون قد حددت أنسب وجبة بالنسبة لك. احقن Suliqua في البطن أو في الجزء الخارجي من الفخذ. لا تنسى أن تغير موضع الحقن في كل مرة.

قبل حقن Suliqua

- اتبع دائمًا التعليمات المرفقة مع نشرة معلومات المريض هذه.
- إذا لم تتبع جميع التعليمات، فقد تحصل على جرعة Suliqua أكثر أو أقل مما ينبغي.

لتجنب الأخطاء: تحقق دائمًا من كرتون الدواء والمصق الموجود على قلم الحقن قبل كل عملية حقن للتأكد من أنك ستستخدم القلم الصحيح، وخاصةً إذا كنت تستخدم أكثر من دواء حقن. اسأل طبيبك، أو صيدلي إذا لم تكن متأكدًا.



متى يتم حقن Suliqua

- لا تحقن جرعة مضاعفة لتعويض جرعة منسية.
- لا تأخذ حقنيتين في اليوم.
- افحص مستوى السكر في دمك ثم احقن الجرعة التالية في الوقت المعتاد.

إذا كنت قد نسيت استخدام Suliqua

إذا كنت قد نسيت جرعة من Suliqua أو إذا لم تقم بحقن مقدارٍ كافٍ من الأنسولين، فقد يصبح مستوى السكر في دمك مرتفعًا جدًا (فرط سكر الدم). إذا لزم الأمر، يمكن حقن Suliqua قبل الوجبة التالية.



كيفية تخزين Suliqua

يجب عدم وضع Suliqua مرة أخرى في الثلجة ويجب ألا يتم تجميده. قم بتخزين قلم الحقن بمعزل عن الحرارة المباشرة أو أشعة الشمس المباشرة. يجب وضع الغطاء الواقي مرة أخرى على قلم الحقن بعد كل حقنة.

لا تترك قلم الحقن في السيارة في يومٍ حارٍ أو باردٍ على نحوٍ غير عادي. لا تقم بتخزين قلم الحقن مع الإبرة المرفقة.

لا يجب التخلص من الأدوية في مياه الصرف أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من العقاقير التي لم تعد تُستخدم. تهدف هذه التدابير إلى حماية البيئة.

قم بتخزين هذا الدواء بعيدًا عن متناول الأطفال وأنظارهم.

استخدمه قبل تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الحزمة وعلى الملصق الموجود على القلم بعد عبارة "EXP" (تاريخ انتهاء الصلاحية). تاريخ انتهاء الصلاحية هو آخر تاريخ من الشهر المذكور.

قبل أول استخدام

قم بتخزين Suliqua في الثلجة (2-8 درجة مئوية). لا يجب تجميده أو تخزينه في تلامس مباشر مع حجرة المجمد أو كتلة المجمد. قم بتخزين قلم الحقن في صندوقه الخارجي لأنه حساس للضوء.

بعد أول استخدام/الأقلام الاحتياطية

يمكن تخزين قلم الحقن لمدة أقصاها 28 يومًا خارج الثلجة، ولكن في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية. تخلص من القلم بعد هذه الفترة الزمنية.

أخرى

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا عانيت من أي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيب، أو صيدلي، أو ممرضة. وهذا ينطبق أيضًا على أي آثار جانبية لم يرد ذكرها في نشرة المعلومات هذه.

عندما تبلغ عن الآثار الجانبية فإنك بذلك قد تساهم في زيادة المعلومات حول سلامة الدواء.



قلم الحقن



Suliqua SoloSTAR® هو قلم مسبق الملاء، يتم فيه ضبط الجرعة على درجات تزيد بمعدل وحدة واحدة. الجرعة القصوى هي 60 وحدة للحقنة.

Suliqua® (أنسولين غلارجين + ليكسيميناتيذ) F، R، 4، 54، 10A، 100 وحدة/مل + 50 ميكروجرام/مل، سائل للحقن، محلول في قلم حقن مسبق الملاء و100 وحدة/مل + 33 ميكروجرام/مل سائل للحقن، محلول في قلم حقن مسبق الملاء. **نواعي الاستعمال:** الغرض من Suliqua، جنباً إلى جنب مع الميتفورمين، هو علاج البالغين الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 لتحسين السيطرة على مستوى السكر في الدم لديهم عندما لا تتحقق السيطرة عليه بشكل كافٍ من خلال استخدام الميتفورمين وحده أو مصحوباً بدواء آخر يُستخدم لخفض الجلوكوز عن طريق الفم أو الأنسولين القاعدي. **تحذيرات وتبويضات:** لا ينبغي استخدام Suliqua لعلاج المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 1 أو الذين يتلقون علاجاً للحمض الكيتوني السكري. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى www.fass.se. **العبرة:** Suliqua SoloStar أقلام 3x3 مل وأقلام 5x3 مل. Sanofi AB، ص.ب. 30052، 104 25 سنكبولم، هاتف: 46 8 634 50 00. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أدويةك، فيرجى إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني: infoavd@sanofi.com. تاريخ آخر مراجعة لمُلخص خصائص المنتج: فبراير 2017.

▼ هذا الدواء خاضع لمراقبة ممتدة. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى www.fass.se.

ملاحظات

لأي استفسار حول منتجات علاج
مرض السكري لدينا، اتصل بنا على:
020-52 68 87

يمكنك معرفة مزيد من المعلومات حول مرض السكري من خلال www.insulin.se
كما يمكنك الاطلاع على معلومات بشأن أنواع الأنسولين المختلفة على www.fass.se

يُرجى قراءة نشرة معلومات المريض بعناية!



Sanofi AB، هاتف: 08 - 634 50 00، www.sanofi.se
إذا كانت لديك أي أسئلة حول أدويتك، فيرجى إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني: infoavd@sanofi.com